

Famiglia	Genere specie	Denominazione volgare	Colore	Longevità	Altezza pianta [cm]	Dimensioni fiore [mm]	Litologia suolo Si - Ca	pH H+/H±/H-	Umidità suolo 1-2-3-4-5	Livello nutritivo N+/N±/N-	Fascia altimetrica [m s.l.m.]		Ambiente	Note
											basale < 300	collinare 200 ÷ 600		
<i>Amaryllidaceae</i>	<i>Narcissu poeticus</i>	Narciso selvatico	Bianco	perenne	20 - 40	35 - 60	Ca - Si/Ca	H±	2 - 3	N+	400 - 2.000	Prati e pascoli, coltivi ornamentali, parchi, giardini, frutteti, praterie, margini di boschi, boschi radi.	Pianta anche ornamentale (es. per la costruzione di giardini rocciosi).	
<i>Apiaceae Umbelliferae</i>	<i>Astrantia major</i>	Astranzia maggiore	Bianco	perenne	30 - 70	20 - 35	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	400 - 2.200	Tagli/bordi/radure/sterrati forestali, prati/pascoli mesofili, praterie, frutteti, boschi.	Il nome <i>astrantia</i> deriva dal latino <i>aster</i> per le brattee aperte a forma di stella. Il nome <i>major</i> distingue l'altra specie (<i>minor</i>) per dimensioni.	
<i>Apiaceae Umbelliferae</i>	<i>Daucus carota</i>	Carota	Bianco	annua pluriennale	40 - 100	40 - 100	indifferente	H±	2 - 3	N±	< 1.500	Incolti, ambienti ruderali, cave di ghiaia, praterie/prati/pascoli (più o meno rocciosi e aridi)	Cultivar/ortaggio con radice più spessa e carnosa, arancione ricca di caroteni. Talora al bianco del fiore si aggiungono tonalità rosa.	
<i>Apiaceae Umbelliferae</i>	<i>Laserpitium siller</i>	Laserpizio sermontano	Bianco	perenne	40 - 150	3 - 5	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	500 - 1.600	Praterie alpine e subalpine, rupi, muri, balme, rocce, ghiaie, morene, detriti, margini boschivi, arbusteti.		
<i>Apiaceae Umbelliferae</i>	<i>Molopospermum peloponnesiacum</i>	Cicutaria fetida	Giallo	perenne	80 - 180	2 - 3	Ca - Si/Ca	H-	4	N±	600 - 2.000	Margini erbacei dei boschi mesotermofili, arbusteti, boschi radi di latrifoglie.	Una delle più grandi odella famiglia; alta anche fino a due metri, dal robusto fusto eretto; molto aromatica.	
<i>Apiaceae Umbelliferae</i>	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Pimpinella saxifraga	Bianco	perenne	15 - 60	3 - 6	indifferente	H±	3	N-	< 1.500	Prati e pascoli mesofili igrofilo, ambienti ruderali, cave di ghiaia, margini di boschi.	Oli nelle radici utili (tisane) alle vie respiratorie.	
<i>Asclepiadaceae</i>	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i>	Vincetossico comune	Bianco	perenne	30 - 100	5 - 10	indifferente	H+	4	N-	< 1.500	Ruderi, detriti, ghiaie, pietraie, praterie e pascoli più o meno aridi e/o pietrosi, margi di arbusti termofili.		
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Achillea erba rotta</i>	Achille erba rotta	Bianco	perenne	12 - 25	8 - 14	Si - Si/Ca	H+	3	N-	1.000 - 2.600	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, rupi, muri, balme, praterie alpine e subalpine.	Nella composizione di liquori atti a migliorare la circolazione sanguigna e le funzioni digestiva ed epatica.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Achillea millefolium</i>	Millefoglio	Rosa	perenne	30 - 60	4 - 8	indifferente	H±	4	N±	< 2.200	Incolti, riposi del bestiame, tagli e schiarite forestali, frutteti, castagneti, praterie e pascoli aridi, boschi radi.	Pianta officinale anticonvulsiva e appetizzante.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Achillea nana</i>	Achillea anana	Bianco	perenne	5 - 10	6 - 10	Si	H±	3	N-	1.500 - 2.900	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, rupi, muri, praterie rase.		
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Achillea structa</i>	Millefoglio rigido	Bianco	perenne	30 - 80	4 - 8	indifferente	H±	3	N+	800 - 2.300	Prati e pascoli mesofili/nitrofilo, praterie alpine/subalpine più o meno rocciose/pietrose, margini di boschi.		
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Adenostyles alliariae</i>	Adenostile con foglie di alliaria	Rosa	perenne	40 - 180	2 - 3	indifferente	H±	2	N+	800 - 2.200	Megaforbieti, ontaneti, saliceti subalpini, balme, campi solcati, lande.	Al di fuori delle Alpi è considerata relitto glaciale.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Adenostyles glabra</i>	Adenostile glabra	Viola	perenne	30 - 60	2 - 3	Ca - Si/Ca	H+	2	N+	900 - 2.200	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, megaforbieti, boschi radi di conifere e/o latifoglie.		
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Antennaria carpatica</i>	Antennaria dei Carpazi	Bianco	perenne	5 - 15	4 - 6	indifferente	H±	4	N-	1.500 - 2.600	Praterie alpine e subalpine, rupi, muri, balme, lande.	Contiene glicosidi tossici in grado di provocare convulsioni e paralisi.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Artemisia chamaemelifolia</i>	Artemisia con foglie di camomilla	Giallo	perenne	20 - 60	3 - 6	indifferente	H±	4/5	N-	400 - 2.100	Praterie, prati, pascoli aridi più o meno pietrosi, rupi, morene, ghiaie, detriti.		
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Aster alpinus</i>	Astro alpino	Viola	perenne	6 - 15	30 - 40	indifferente	H+	4	N-	900 - 2.600	Praterie alpine e subalpine, rupi, muri, balme, lande, pinete, gineprai.	Specie protetta in alcune regioni, talora utilizzata come ornamentale soprattutto in giardini rocciosi.	

<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Bellis perennis</i>	Margheritina, Pratolina comune	Bianco	perenne	5 - 15	15 - 20	indifferente	H±	3	N+	< 1.500	Parchi, tappeti erbosi, giardini, viali, frutteti, piantagioni, prati e pascoli mesofili, praterie.	Spesso al bianco del fiore si aggiungono tonalità rosa dopo le notti più fredde. I capolini si chiudono in assenza di luce.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Bidens frondosa</i>	Bidente foglioso, forbicina pedunculata	Giallo	annuale	30 - 150	10 - 20	indifferente	H±	2	N+	< 600	Ambienti più o meno umidi, rive di fossi e di corsi d'acqua, ambienti ruderali umidi.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Carlina acauli</i>	Carlina bianca	Bianco	perenne	3 - 15	35 - 50	Ca - Si/Ca	H±	4	N-	600 - 2.400	Praterie, prati e pascoli aridi e/o pietrosi, ghiaie, morene, pietraie, rudeuri.	I capolini si aprono con tempo asciutto; le brattee convergono verso il centro in presenza di umidità.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Centaurea jacea jacea</i>	Centaurea iacea	Viola	perenne	30 - 80	25 - 45	indifferente	H±	3	N±	< 1.000	Prati e pascoli mesofili igrofilo, margini di boschi, arbusteti.	L'elevato contenuto tanninico non ne fa un buon foraggio. Facile fuoriuscita del polline. Fiore gradito ad api e farfalle.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Centaurea jacea angustifolia</i>	Centaurea a foglie strette	Viola	perenne	30 - 110	25 - 45	indifferente	H±	3	N±	< 900	Praterie aride, margini di boschi.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Centaurea montana</i>	Centaurea montana	Blu	perenne	20 - 80	45 - 70	indifferente	H±	3	N±	400 - 2.200	Prati e pascoli mesofili, praterie rase subalpine e alpine, margini dei boschi e boschi radi, megaforbieti.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Centaurea scabiosa</i>	Fiordaliso vedovono	Viola	perenne	30 - 120	40 - 70	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.500	Praterie, prati e pascoli aridi e/o pietrosi, margini di boschi, arbusteti.	Corpo oleoso sotto il frutto che attira le formiche. Brattee ciliate che si attaccano al pelo degli animali.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Centaurea stoebe</i>	Centaurea dei prati steppici, fiordaliso dei pascoli	Viola	biennale	30 - 120	15 - 25	indifferente	H±	4/5	N±	< 1.200	Rupi, muri, balme, praterie, prati e pascoli aridi e più o meno rocciosi, margini di boschi e di arbusti meso-termofili.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Cicerbita alpina</i>	Cicerbita, lattuga alpina	Viola	perenne	50 - 200	20 - 30	indifferente	H±	2	N+	900 - 2.100	Tagli e bordi forestali, aree incendiate, bordi di corsi d'acqua, saliceti, ontaneti, megaforbieti.	Si credeva aumentasse la produzione di latte.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Cichorium intybus</i>	Cicoria comune, radicchio	Viola	perenne	20 - 120	30 - 50	indifferente	H+	4	N±	< 1.500	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini di piste, ferrovie e muri, campi, colture, incolti.	Radici tostate nel XVIII secolo in alternativa al caffè. Dalle radice si trae insulina. Variata coltura officinali.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Cirsium arvense</i>	Cardo campestre, cirsio dei campi	Viola	perenne	30 - 150	8 - 18	indifferente	H±	3	N+	< 1.500	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini di piste, alluvioni, tagli forestali.	Pianta che si diffonde rapidamente, anche considerata infestante.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Cirsium eriophorum</i>	Cardo scardaccio, cirsio lanoso	Viola	biennale	50 - 150	40 - 70	Ca - Si/Ca	H+	4	N+	500 - 2.200	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini di piste, ferrovie e muri, balme, radure boschive, praterie.	In passato si usavano germogli del II anno come verdure ed infiorescenze come carciofi.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Crepis pigmaea</i>	Crepide pigmea, dei ghiaioni	Giallo	perenne	4 - 12	20 - 30	Ca	H+	3	N-	900 - 2.700	Ghiaie, morene, pietraie, detriti, rupi, muri.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Echinops Sphaerocephalus</i>	Cardo-pallottola maggiore	Blu	perenne	50 - 150	40 - 60	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.700	Campi, colture, incolti, coltivati, ambienti ruderali e semi-ruderali, praterie, prati, pascoli.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Erigeron annuus</i>	Cespica annua, erigeron annuale	Bianco	annua pluriannuale	30 - 150	10 - 25	indifferente	H±	4	N+	< 1.000	Pioniera di rive, fossi, sentieri, ghiaie, incolti.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Eupatorium cannabinum</i>	Canapa acquatica	Rosa	perenne	50 - 150	2 - 5	Ca - Si/Ca	H+	2	N+	< 1.200	Zone umide, megaforbieti.	Il nome specifico è ricavato dalla somiglianza di questa pianta con la comune canapa.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Helianthus tuberosus</i>	Tobinambur, Girasole del Canada	Giallo	perenne	100 - 250	40 - 80	indifferente	H±	3	N±	< 1.600	Terreni ricchi e umidi, rive di fiumi, colti abbandonati.	Esotica dal 1619, sostituita dalla patata.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Galinsoga ciliata</i>	Gallinsoga cigliata	Bianco	annuale	10 - 50	6 - 8	indifferente	H±	3	N+	< 800	Campi, colture, incolto, ambienti ruderali, parchi, giardini.	Di origine Sud-americana sta diventando cosmopolita. Infestante.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Hieracium alpicola</i>	Sparviere alpicolo	Giallo	perenne	10 - 25	15 - 25	Ca - Si/Ca	H-	3	N-	800 - 2.800	Praterie rase alpine e subalpine.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Hieracium murorum</i>	Sparviere dei boschi	Giallo	perenne	20 - 50	20 - 35	indifferente	H±	4	N±	< 2.200	Campi, ambienti asciutti, rive, ghiaie, rupi, praterie, pascoli.	Genere ricchissimo di specie e sottospecie.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Hieracium pilosella</i>	Sparviere pelosetto, pelosella	Giallo	perenne	5 - 30	20 - 30	indifferente	H±	4	N±	< 2.500	Ambienti ruderali, rocce, sabbie, praterie aride.	In siccità le foglie si arrotolano e riflettono la luce.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Hypochaeris radicata</i>	Erba porcellina radicata	Giallo	perenne	15 - 60	20 - 40	indifferente	H-	3	N±	< 1.000	Tagli e strade forestali, parchi, giardini, viali, praterie e pascoli magri, brughiere.	Specie da pascolo; apprezzata dai suini.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Inula salicina</i>	Inula con foglie di salice	Giallo	perenne	20 - 60	25 - 35	Ca - Si/Ca	H+	3	N-	< 1.400	Ambienti ± umidi, torbiere, praterie, prati e pascoli igrofilo, margini erbacei di boschi.	Pianta contenente inulina. Gli alimenti contenenti tale sostanza sono adatti ai diabetici.

<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Leodontodon autumnalis</i>	Dente di leone	Giallo	perenne	8 - 50	15 - 30	indifferente	H±	3	N±	< 1.500	Tappeti erbosi, parchi, giardini, viali, prati e pascoli mesofili.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Leontopodium alpinum</i>	Stella alpina	Bianco	perenne	8 - 20	4 - 6	Ca	H+	4	N-	1.400 - 2.700	Praterie rase alpine e subalpine, ghiaie, greti, rupi, muri, balme, morene, pietraie, boschi radi di conifere.	La lanosità della pianta serve per limitare una eccessiva traspirazione (la specie ha origini negli altopiani desertici dell'Asia centrale).
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Margherita comune	Bianco	perenne	20 - 80	40 - 55	indifferente	H±	3	N±	< 2.200	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, radure boschive, prati.	Tossica per il bestiame, diminuisce con la sua presenza il valore dei pascoli e modifica significativamente, uniformandolo, il paesaggio.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Petasites albus</i>	Farfaccio bianco	Bianco	perenne	10 - 80	6 - 12	indifferente	H±	2	N+	500 - 1.500	Tagli, sterrate e margini di boschi, ghiaie, detriti, pietraie, bordi di ruscelli, megaforbieti nitrofilo, boschi di latifoglie.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio aquaticus</i>	Senecio acquatico, dei rivi	Giallo	biennale perenne	20 - 60	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±	2	N+	< 500	Zone umide, rive, torbiere, prati e pascoli igrofilo mesofili, boschi umidi di latifoglie.	Pianta indicatrici della presenza di fertilizzanti nei prati umidi.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio doronicum</i>	Senecio doronico	Giallo	perenne	20 - 50	30 - 60	Ca - Si/Ca	H+	3	N-	1.000 - 2.500	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie, lande, pinete rade.	Specie proteiforme: individui nelle zone più estreme della variabilità possono essere considerati erroneamente specie distinte.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio inaequidens</i>	Senecio sudafricano	Giallo	annuale	30 - 100	15 - 25	indifferente	H±	4	N±	< 800	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, rupi, muri, balme.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio incanus</i>	Senecio biancheggiante	Giallo	perenne	4 - 8	10 - 15	Si - Si/Ca	H-	4	N-	1.200 - 2.600	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, balme, praterie e pascoli magri, lande.	Contengono oli essenziali (dal caratteristico odore) e sostanze per la difesa contro insetti fitofagi ed erbivori.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio ovatus</i>	Senecio ovato	Giallo	perenne	60 - 150	20 - 30	indifferente	H±	3	N+	300 - 1.700	Tagli, schiarite e strade forestali, margini di boschi, arbusteti, megaforbieti, boschi radi di latifoglie.	Sono presenti alcaloidi nella pianta che possono danneggiare il fegato e provocare tumori.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Senecio rupestris</i>	Senecio rupestre	Giallo	annua, biennale, perenne	20 - 60	15 - 20	Ca - Si/Ca	H±	3	N±	400 - 2.200	Campi, colture, vigneti, balme, tagli e piste forestali, ghiaie, detriti, pietraie, morene, boscaglie di pini.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Solidago Canadensis</i>	Verga d'oro del Canada	Giallo	perenne	50 - 180	3 - 5	indifferente	H±	3	N±	< 600	Ambienti ± umidi, incolti, ambienti ruderali, macereti, sentieri, scarpate, pioppeti, coltivi ornamentali.	Specie esotica del Nord America.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Sonchus asper</i>	Crespigno ruvido	Giallo	annua biennale	30 - 100	15 - 25	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, parchi, prati, giardini.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Stemmacantha rhapsantica</i>	Centaurea di Lamarck	Viola	perenne	40 - 150	50 - 70	Ca - Si/Ca	H-	3	N+	900 - 2.100	Praterie alpine e subalpine più o meno pietrose, megaforbieti nitrofilo.	
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Tanacetum vulgare</i>	Tanaceto comune	Giallo	perenne	30 - 150	8 - 12	indifferente	H±	4	N±	< 1.200	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, tagli e strade forestali, arbusteti meso-termofili.	In passato usata come mezzo abortivo, talora con avvelenamenti gravi. Infuso delle foglie contro i pidocchi. Essicata contro le tarme.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Taraxacum officinale</i>	Tarassaco, dente di leone, soffione	Giallo	perenne	5 - 50	30 - 60	indifferente	H±	3	N+	< 2.000	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, radure boschive, prati, pascoli, tagli e strade forestali.	Uso culinario, lenisce disturbi biliari e digestivi.
<i>Asteraceae Compositae</i>	<i>Tussilago farfara</i>	Tussilagine comune, farfaro	Giallo	perenne	5 - 30	23 - 30	indifferente	H+	3	N±	< 1.800	Campi, colture, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rive, ghiaie, morene, pietraie.	Mucillagini per la tosse, alcaloidi velenosi.
<i>Aquifoliaceae</i>	<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio	Bianco	Albero	1 - 8 m	6 - 9	indifferente	H±	3	N±	< 1.400	Boschi di faggio e abete, carpineti e querceti mesofili. Ambienti con discreta/abbondante piovosità.	Lento accrescimento, bacche decorative, anche pianta ornamentale. Sempreverde con foglie coriacee e talora spinose.
<i>Balsaminaceae</i>	<i>Impatiens balfourii</i>	Impaziente di Balfour	Viola	annuale	40 - 120	25 - 40	indifferente	H±	3	N+	< 600	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, siepi, margini freschi di boschi, coltivi ornamentali.	Esotica (Himalaya).
<i>Balsaminaceae</i>	<i>Impatiens grandilifera</i>	Impaziente ghiandolosa	Rosa	annuale	100 - 200	25 - 40	indifferente	H+	2	N+	< 800	Siepi, margini freschi di boschi, zone umide. Bordi di ruscelli, megaforbieti, coltivi ornamentali.	Esotica (Himalaya).
<i>Berberidaceae</i>	<i>Berberis bealei</i>	Crespino di Beale	Giallo	arbusto	100 - 300	6 - 10	indifferente	H±	3	N±	< 600	Parchi, margini di tappeti erbosi, giardini.	Specie alloctona, originaria della Cina.
<i>Betulaceae</i>	<i>Corylus avellano</i>	Nocciolo	Rosso (fem.)	albeo	1 - 5 m	2 - 3	indifferente	H±	3	N±	< 1.200	Arbusteti meso-termofili, boschi di latifoglie	Specie molto diffusa, rustica ed ampiamente coltivata.
<i>Boraginaceae</i>	<i>Echium vulgare</i>	Viperina comune	Blu	biennale perenne	20 - 80	10 - 20	indifferente	H±	5	N+	< 1.200	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rocce, sabbie, ghiaie, pietraie, rupi, muri, praterie aride.	Fiore a forma di testa di vipera. Alcaloidi dannosi.
<i>Boraginaceae</i>	<i>Myosotis sylvatica</i>	Nontiscordardimé	Blu	biennale perenne	15 - 40	6 - 10	indifferente	H±	3	N+	400 - 2.200	Tagli e strade forestali, boschi radi, prati e pascoli mesofili, praterie, megaforbieti..	Può formare tappeti fioriti.

<i>Boraginaceae</i>	<i>Pulmonaria anustifolia/australis</i>	Polmonaria a foglie stette, meridionale	Blu	perenne	15 - 30	12 - 20	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	<2.100	Margini dei boschi, arbusteti, tagli forestali, piste, boschi radi termofili (pinete, gineprai, latifoglie)	Il genere allude alle chiazze sulle foglie, simili agli alveoli polmonari: si credeva che queste piante fossero efficaci contro le malattie polmonari;
<i>Boraginaceae</i>	<i>Symphytum officinale</i>	Consolida maggiore	Bianco	perenne	40 - 100	12 - 20	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Ambienti +/- umidi, prati e pascoli igrofilo, praterie rase umide, megaforbieti.	Usata dalla medicina popolare per l'iproprietà vulnerarie (guarisce le ferite); pare inoltre che stimoli la formazione del callo osseo in caso di fratture.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Aethionema thomasianum</i>	Etionema di Thomas	Rosa	perenne	5 - 12	3 - 6	ca	H+	3	N-	1.000 - 2.200	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri.	Pianta rara, endemica delle alpi occidentali.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Alliaria petiolata</i>	Alliaria comune	Bianco	perenne	20 - 80	5 - 8	indifferente	H+	3	N+	< 1.200	Siepi, margini di boschi, balme, rive, ghiaie, tagli forestali, pioppeti, ontaneti, saliceti.	Foglie giovani e semi utili per aromatizzare formaggi e insalate.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Arabidopsis thaliana</i>	Arabetta di Thal	Bianco	annuale biennale	15 - 50	2 - 4	indifferente	H-/H±/H+	4	N±	< 1.100	Campi, colture, vigne, ambienti ruderali, sabbie, praterie aride.	Pianta con genoma molto piccolo per cui si presta molto bene per ricerche genetiche.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Barbarea vulgaris</i>	Erba di santa barbara	Giallo	biennale perenne	20 - 90	5 - 8	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate; ampiamente adattabile in zone sia secche sia umide.	Foglie ricche di vitamina C.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Berteroa incana</i>	Berteroa comune	Bianco	annua biennale perenne	30 - 60	6 - 10	indifferente	H±	5	N±	< 1.600	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rive, siepi, balme, margini di boschi.	Una sola pianta può produrre fino a 7.000 semi dall'elevato potere di germinazione.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Biscutella laevigata</i>	Biscutella levigata/montanina	Giallo	perenne	20 - 40	7 - 10	Ca - Si/Ca	H±/H+		N-	1.000 - 2.500	Praterie e pascoli aridi, più o meno rocciose e/o pietrose, rupi, muri, balme, pinete rade, gineprai.	All'esterno dell'arco alpino questa pianta è considerata relitto glaciale.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Brassica napus</i>	Ravizzone, colza, navone	Giallo	annua biennale perenne	60 - 120	12 - 18	indifferente	H±	3	N+	< 1.000	Campi, colture, vigne, ambienti ruderali.	
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Calepina irregularis</i>	Calepina irregolare	Bianco	annua biennale	20 - 40	3 - 5	indifferente	H±	4/5	N+	< 500	Campi, colture, vigne, ambienti ruderali.	Il nome specifico " <i>irregularis</i> " allude alla notevole variabilità della specie.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Borsa del pastore	Bianco	annuale biennale	10 - 60	3 - 5	indifferente	H±	4	N+	< 1.800	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, parchi, giardini,...	Frutti a forma delle bisacce dei pastori del medioevo.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Coincya cheiranthos montana</i>	Senape violaciocca montana	Giallo	perenne	10 - 30	18 - 24	Si	H-	3	N±	800 - 2.200	Ghiaie, morene, pietraie, detriti, praterie rase alpine e subalpine, rupi, balme.	
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Erucastrum gallicum</i>	Erucastro francese	Giallo	annua, bien., perenne	20 - 50	8 - 10	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N-	< 1.200	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, cave di ghiaia e di pietre, sentieri, sterrate.	
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Erysimum rhaeticum</i>	Violaciocca retica/svizzera	Giallo	perenne	10 - 70	12 - 20	Si - Si/Ca	H±	4	N-	< 2.000	Praterie, prati e pascoli aridi, più o meno petrosi.	
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Hugueninia tanacetifolia</i>	Uguenina con foglie di tanaceto	Giallo	perenne	20 - 100	4 - 7	Si - Si/Ca	H±	2	N+	1.100 - 2.200	Megaforbieti, popolamenti a felci, ambienti ruderali, prati e pascoli mesofili, praterie, ontaneti, saliceti.	In Italia il genere <i>Hugueninia</i> comprende una sola specie.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Isatis tinctoria</i>	Isatis dei tintori, guado	Giallo	Biennale, perenne	40 - 120	3 - 6	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.200	Ambienti ruderali e semi ruderali, campi, colture, vigne, incolti, rupi, balme, praterie.	Il guado fa parte delle cosiddette "piante da blu", da cui si ricava un colorante di questo colore.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Lunaria annua</i>	Lunaria meridionale	Viola	perenne	40 - 100	18 - 26	indifferente	H+	3	N+	< 600	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rive, siepi, balme, margini di boschi, coltivati ornamentali.	Frutti caratteristici: grandi silique erette, ovato ellittiche (6/7 cm) con grandi semi visibili in trasparenza.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Matthiola valesiaca</i>	Violaciocca del vallese	Rosa	perenne	10 - 20	15 - 25	Ca	H+	4	N-	< 1.800	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muretti, balme.	
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Rorippa amphibia</i>	Crescione anfibio	Giallo	perenne	30 - 100	4 - 7	indifferente	H±	1	N+	< 600	Ambienti acquatici: rive, stagni, fossi, lanche, paludi, stagni.	Può vivere perennemente immersa in acqua.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Sinapsis arvensis</i>	Medaglione del papa	Giallo	annuale	20 - 80	10 - 16	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N+	< 1.500	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	La pianta contiene olii nei suoi tessuti che la proteggono dagli erbivori.
<i>Brassicaceae Cruciferae</i>	<i>Thlaspi rotundifolia corymbosum</i>	Tlasi corimbo, di Leresche	Rosa	perenne	2 - 7	6 - 11	Ca - Si/Ca	H±	3	N-	1.000 - 2.800	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muretti, balme.	
<i>Buddlejaceae</i>	<i>Buddleja davidii</i>	Buddleia, albero delle farfalle	Rosa	arbusto	1 - 3 m	8 - 10	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	< 800	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rive, detriti, ghiaie, margini di boschi.	Specie esotica della Cina
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula barbata</i>	Campanula barbata	Blu	perenne	10 - 40	20 - 30	indifferente	H-	3	N-	1.000 - 2.500	Praterie alpine e subalpine, lande, boschi radi di conifere, talora misti a latifoglie.	Il nome specifico (<i>barbata</i>) si riferisce alle fitte barbe presenti alle fauci della corolla.

<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula elatines</i>	Campanula elatines	Blu	perenne	10 - 30	12 - 20	Si	H-	4	N-	< 1.700	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, ruderi, coltivati ornamentali.	Endemismo piemontese
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula cenisia</i>	Campanula del Moncenisio	Blu	perenne	2 - 8	10 - 22	Ca	H+	3	N-	1.800 - 2.900	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri, balme.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula glomerata</i>	Campanula agglomerata	Viola	perenne	20 - 60	15 - 30	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	< 1.400	Praterie, prati e pascoli aridi, più o meno rocciosi e/o petrosi, prati mesofili, margini dei boschi.	Come quasi tutte le campanule se stropicciata o spezzata, presenta un succo lattiginoso.
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula patula costae</i>	Campanula di Costa	Rosa	biennale perenne	30 - 70	16 - 34	indifferente	H±	4	N±	< 1.400	Praterie, prati e pascoli aridi, più o meno rocciosi e/o petrosi, margini dei boschi.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula persicifolia</i>	Campanula con foglie di pesco	Blu	perenne	50 - 80	25 - 40	Ca - Si/Ca	H+	4	N+	< 1.500	Tagli e piste forestali, margini meso-termofili dei boschi, arbusteti, pinete, gineprai, boschi di latifoglie.	Quando il fusto elastico veiene piegato da animali, ritorna con uno scatto che proietta semi nell'area intorno.
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula rapunculoides</i>	Campanula falso raponzolo	Rosa	perenne	30 - 80	20 - 30	indifferente	H±	3	N±	< 1.800	Margini dei boschi e dei arbusteti, ambienti ruderali e semi-ruderali.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula spicata</i>	Campanula spigata	Blu	bienne perenne	15 - 80	12 - 25	indifferente	H±	4/5	N+	< 1.600	Praterie, pascoli e prati aridi, più o meno petrosi, ghiaie, pietraie, detriti.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Campanula thyrsoides</i>	Campanula gialla	Giallo	bienne perenne	10-40	15-25	Ca - Si/ca	H±	4	N±	1.000 - 2.700	Praterie rase, anche rocciose, subalpine e alpine, ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Phyteuma hemisphaericum</i>	Raponzolo emisferico	Blu	perenne	3 - 15	10 - 20	Si	H-	5	N-	1.000 - 3000	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie rase alpine e subalpine, lande.	
<i>Campanulaceae</i>	<i>Phyteuma ovatum</i>	Raponzolo ovato	Blu	perenne	40 - 80	40 - 100	Ca - Si/Ca	H±	2	N+	500 - 2.100	Prati, praterie e pascoli mesofili più o mrno umidi, margini di boschi, megaforbieti, ontanei e saliceti.	
<i>Caprifoliaceae</i>	<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio giapponese	Bianco	arbusto	2 - 6 m	30 - 40	indifferente	H±	3	N+	< 600	Arbusteti meso-termofili, coltivati, viali, giardini, boschi radi di latifoglie.	Sempreverde, rampicante, alloctona.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Cerastium arvense</i>	Cerastio	Bianco	perenne	20 - 40	15 - 22	indifferente	H±	4	N±	< 2.000	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, prati e pascoli msefili, sentieri, scarpate, prati radi, terreni secchi.	Cresce spesso sui formicai dove sembra trovare condizioni favorevoli.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Cerastium brachypetalum</i>	Cerastio a petali brevi	Bianco	annuale	5 - 30	4 - 8	Ca - Si/Ca	H±/H+	5	N-	<600	Affiormaneti rocciosi, sabbie, praterie, prati e pascoli aridi e più o meno rocciosi.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Cerastium uniflorum</i>	Cerastio unifloro	Bianco	perenne	2 - 6	15 - 22	Si - Si/Ca	H-	3	N-	1.400 - 2.800	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, rupi, muri, balme.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Dianthus sp</i>	Garofano generico	Bianco	perenne	10 - 20	15 - 25	indiferente	H±	3	N±	< 1.500	Giardini, talora presente come specie diffusa da coltivati artificiali.	Varieta coltivata
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Dianthus pavonius</i>	Garofano pavonio	Viola	perenne	2 - 10	15 - 25	Si - Si/Ca	H±	4	N-	1.000 - 2.700	Praterie rase alpine e subalpine.	Endemismo piemontese
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Dianthus seguieri</i>	Garofano di Séguier	Viola	perenne	30 - 60	15 - 25	Ca - Si/Ca	H±	5	N-	< 2.000	Praterie rase, prati e pascoli aridi, più o meno rocciosi e/o petrosi, margini di boschi, arbusteti.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Gypsophila muralis</i>	Gipsofila dei muri	Bianco	annuale	5 - 25	4 - 6	Si - Si/Ca	H-	3	N-	< 1.000	Colture, terreni umidi con ampie fluttuazioni idriche, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	Diversamente dalla denominazione questa pianta non cresce quasi mai sui muri.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Moehringia muscosa</i>	Moeringia muscosa	Bianco	perenne	5 - 20	8 - 11	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N-	400 - 2.000	Rupi, muri, balme, pietraie, detriti.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Minuartia recurva</i>	Minuartia ricurva	Bianco	perenne	5 - 15	6 - 9	Si	H-	4	N-	1.200 - 2.700	Praterie rase alpine e sub-alpine, rupi, balme, ghiaie, morene, pietraie.	Il nome specifico fa riferimento alle foglie caratteristicamente ricurve.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Minuartia verna</i>	Minuartia primaverile	Bianco	perenne	2 - 10	6 - 10	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N-	1.000 - 2.700	Praterie alpine e subalpine, ghiaie, morene, pietraie, detriti, prati e pascoli aridi, piu o meno petrosi.	Il nome specifico significa in latino primaverile,, indicandone la precoce fioritura.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Moehringia ciliata</i>	Moheringia cigliata	Bianco	perenne	5 - 15	6 - 10	Ca	H±/H+	3	N-	600 - 2.000	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie rase sub-alpine e alpine.	il nome specifico si riferisce alle foglie che spesso sono cigliate alla base.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Saponaria ocymoides</i>	Ocimoide/saponaria rossa	Rosa	biennale perenne	20 - 30	9 - 13	indifferente	H±/H+	4	N-	< 2.000	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, pinete, gineprai, querceti termofili, ambienti ruderali, ghiaie, morene, pietraie.	Saponaria dal latino <i>sapo</i> = sapone per le saponine contenute nelle radici delle piante di questo genere.

<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Saponaria officinalis</i>	Saponaria, saponella, saponina	Rosa	perenne	30 - 70	25 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N+	< 1.000	Zone umide, megaforbiati nitrofilo, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini freschi di boschi.	Radici contenenti saponine, fluidificante del catarro
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Saponaria lutea</i>	Saponaria gialla	Bianco	perenne	5 - 10	8 - 11	Ca	H±/H+	4	N-	900 - 2.800	Prati, pascolo, pratwrie calcaree, più o meno aride e pietrose, rupi, pietraie, detriti.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene acaulis excapa</i>	Silene acaule	Rosa	perenne	1-3	4 - 8	indifferente	H-	3/4	N-	1.800 - 2.600	Ghiaie, morene, pietraie, detriti, praterie rase alpine e subalpine, rupi, balme.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene armeria</i>	Silene armeria	Viola	annuale, biennale	15 - 60	10 - 12	Si	H-	4	N-	< 1.200	Affioramenti rocciosi, ambienti sabbiosi, rupi, ambienti ruderali, parchi, giardini, prati aridi, margini di boschi.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene flos-jovis</i>	Silene fior di Giove	Viola	perenne	30 - 80	20 - 30	Si	H-	N±	N±	600 - 2.200	Praterie, prati e pascoli aridi ± pietrosi, ambienti ruderali, rupi. Marvini di boschi, arbusteti.	Contiene saponine che irritano le mucose e provocano vomito.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene flor-cuculi</i>	Crotonella/silene fior di cuculo	Rosa	perenne	30 - 90	20 - 30	indifferente	H±	2	N±	< 1.600	Prati e pascoli mesofili e igrofilo, rive di zone umide, torbiere.	Contiene saponine irritano mucose e provocano vomito.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene latifolia</i>	Silene bianca	Bianco	biennale perenne	30 - 70	25 - 30	indifferente	H±	2	N+	< 1.400	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, parchi, giardini, prati e pascoli mesofili e nitrofilo.	Fiori dal tardo pomeriggio e nella notte emanati profumo per farfalle notturne. Contiene saponine usate in passato per il bucato.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene nutans</i>	Silene pendula (ciondola)	Bianco	perenne	25 - 50	9 - 16	indifferente	H±	4	N-	< 1.300	Praterie rase, più o meno rocciose/petrose, prati e pascoli aridi, margini dei boschi, arbusteti, pèinete, gineprai.	
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Silene vulgaris</i>	Erba del cucco, silene rigonfia	Bianco	perenne	30 - 70	12 - 22	indifferente	H±	N±	N-	< 2.000	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie, pascoli, prati aridi.	I calici panciuti, ovidali, circondano anche le capsule mature e fungono da vele per la propagazione nel vento.
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Stellaria graminea</i>	Stellaria graminea	Bianco	perenne	10 - 40	7 - 10	indifferente	H-	3	N±	1.000 - 2.500	Praterie, pascoli, prati aridi, colture, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	Fiorisce di notte e produce un profumo intenso che attira gli impollinatori , per lo più falene .
<i>Caryophyllaceae</i>	<i>Stellaria media</i>	Stellaria comune	Bianco	annua bienne perenne	10 - 40	6 - 8	indifferente	H±	3	N+	< 1.300	Campi, colture, vigne, ambienti ruderali, parchi, tappeti erbosi, giardini, viali, campi sportivi.	Contiene saponine steroidali che aumentano l'assorbimento di tutti i nutrienti, specialmente i minerali, dalla mucosa digestiva.
<i>Celastraceae</i>	<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine comune, berretta del prete	Rosso	perenne	100 - 300	6 - 10	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 1.500	Arbusteti mesotermofili, boschi radi di latifoglie.	Frutti simili ai mitra dei vescovi, appetiti dagli uccelli. Contiene alcaloidi e glicosidi cardioattivi.
<i>Cistaceae</i>	<i>Helianthemum nummularium (grandiflorum)</i>	Eliantemo a fiori grandi	Giallo	perenne	10 - 30	20 - 30	indifferente	H±	4	N-	1.000 - 2.500	Campi solcati, praterie rase alpine e subalpine, lande, arbusteti mesotermofili, boscaglie di pini.	<i>Helianthemum: hēlios</i> (=sole) e <i>ànthos</i> (=fiore) per breve durata di un giorno dei fiori, oppure indica questi fiori vogliono le zone soleggiate.
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Calystegia sepium</i>	Convolvolo delle sipei, campanella	Bianco	perenne	30 - 300	3 - 6	Ca - Si/Ca	H+	2	N+	< 1.200	Ambienti umidi, rive di zone umide, megaforbiati nitrofilo, arbusteti di luoghi torbosi	Germogli compiono giro completo in 2 ore.
<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus mas</i>	Corniolo	Giallo	Albero	6 m	20 - 30	Ca - Si/Ca	H+	2	N±	< 600	Arbusteti mesotermofili, boschi radi di latifoglie.	Anche coltivato come pianta ornamentale.
<i>Cornaceae</i>	<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinella	Bianco	arbusto	2 - 4 m	8 - 12	indifferente	H±/H+	2	N±	< 1.200	Arbusteti, pioppeti, ontaneti. Frassineti, saliceti, boschi radi di latifoglie più o meno umidi.	Il nome Sanguinella è riferito al colore della corteccia dei rami e a quello delle foglie che diventano rossastre in autunno.
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum acre</i>	Sedo acre, erba pignola	Giallo	perenne	3 - 10	10 - 14	indifferente	H±	5	N-	< 2.100	Affioramenti rocciosi, sabbie, praterie, prati e pascoli aridi, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	Germogli provocano vomito e diarrea.
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum album</i>	Sedo bianco, borracina bianca	Bianco	perenne	10 - 20	6 - 10	indifferente	H±	5	N-	< 2.100	Affioramenti rocciosi, sabbie, praterie, prati e pascoli aridi, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	Foglie con strato ceroso che limita la traspirazione.
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum anacampseros</i>	Sedo anacampsero	Rosa	perenne	10 - 30	8 - 12	Si	H-	4	N-	1.200 - 2.600	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, rupi, muri, balme, lande, boscaglie rade.	Il nome specifico deriva dal greco: in Plutarco e Plinio è una pianta usata come filtro per ridestare in altri l'amore.
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum telephium</i>	Sedo telefio	Rosso	perenne	25 - 60	6 - 10	Ca-Si/Ca	H-	4	N-	< 1.500	Rupi, muri, balme, rocce, ghiai, morene, detriti, pietraie, margini di boschi termofili, arbusteti.	Anticamente le foglie usate come antiemorragico. Foglie giovani consumate come insalata ricca di vitamina C.
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum montanum</i>	Sedo montano, borracina montana	Giallo	perenne	5 - 30	9 - 14	Si	H-	5	N-	400 - 1.800	Affioramenti rocciosi, sabbie, rupi, muri, balme, ghiaie, morene, pietraie, detriti, praterie, prati, pascoli aridi.	
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sedum villosum</i>	Sedo villoso	Rosa	annua bienne perenne	5 - 20	6 - 10	Si	H-	2	N-	900 - 2.900	Sorgenti, stillicidi, cascate, bordi di ruscelli, torbiere.	
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sempervivum arachnoideum</i>	Semprevivo ragnateloso	Rosa	perenne	6 - 10	10 - 20	Si- Si/Ca	H-	5	N-	800 - 2.800	Affioramenti rocciosi, sabbie, rupi, muri, balme, ghiaie, morene, pietraie, detriti, praterie, prati, pascoli aridi.	Le foglie succulente, riunite in una rosetta basale, presentano peli biancastri (ragnatelosi) contro il freddo.

<i>Crassulaceae</i>	<i>Sempervivum grandiflorum</i>	Semprevivo a fiori grandi, di Gaudin	Giallo	perenne	10 - 25	30 - 40	Si	H-	4/5	N-	1.000 - 2.900	Giaie, morene, pietraie, detriti, rupi, muri.	
<i>Crassulaceae</i>	<i>Sempervivum tectorum</i>	Semprevivo dei tetti	Rosa	perenne	10 - 60	20 - 30	Si	H±	5	N±	800 - 2.200	Affioramenti rocciosi, sabbie, rupi, muri, balme, ghiaie, morene, pietraie, detriti, praterie, prati, pascoli aridi.	Diverse subspecie: tectorum, alpinum, schottii,...
<i>Cyperaceae</i>	<i>Heriophorum angustifolium</i>	Erioforo a foglie strette	Bianco	perenne	10 - 50	20 - 30	indifferente	H-	1	N-	400 - 2.400	Zone umide, rive di ambienti acquatici, sorgenti, stillicidi, cascate, torbiere.	Grazie ai peli lunghi fino a 5 cm, i frutti possono percorrere diversi chilometri in volo.
<i>Dipsacaceae</i>	<i>scabiosa columbaria</i>	Scabiosa, vedovina selvatica	Viola	perenne	20 - 60	20 - 35	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	500 - 2.100	Praterie, prati e pascoli aridi, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, rupi, muri, arbusteti mesotermofili.	Antico utilizzo contro la scabbia.
<i>Equisetaceae</i>	<i>Equisetum arvense</i>	Equiseto dei campi	Marrone	perenne	10 - 50	10 - 40	indifferente	H±	3	N±	< 2.200	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, sentieri, sterrate, tagli e schiarite forestali	
<i>Ericaceae</i>	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i>	Uva ursina comune	Bianco	arbusto	20 - 100	5 - 6	indifferente	H±	4	N-	600 - 2.200	Lande, popolamenti a lavanda, boscagli di pini montani, pinete, gineprai, rupi, ghiaie, morene	Arbusto nano. Bacche gradite dsgli orsi.
<i>Ericaceae</i>	<i>Culluna vulgaris</i>	Brugo, brughiera, falsa erica	Viola	arbusto	10 - 90	2 - 3	Si - Si/Ca	H-	3	N-	600 - 2.600	Praterie rase (e rocciose) alpine e subalpine, torbiere, boscaglie di pini montani, pinete, gineprai, boschi radi.	Specie spesso confusa con l'erica.
<i>Ericaceae</i>	<i>Rhododendron ferrugineum</i>	Rododendro ferrugineo	Rosso	arbusto	30 - 120	10 - 18	indifferente	H-	3	N-	1.200 - 2.200	Praterie rase (e rocciose) alpine e subalpine, lande, popolamenti a lavanda, boscaglie, pinete, gineprai.	Diverse cultivar appartenenti a questo genere e prevalentemente esotiche a scopo ornamentale.
<i>Ericaceae</i>	<i>Vaccinium myrtillus</i>	Mirtillo nero	Rosso	arbusto	10 - 50	5 - 7	indifferente	H-	3	N-	600 - 2.600	Lande, boscaglie, boschi radi dilatifoglie e soprattutto di conifere, praterie	Le bacche contengono acidi (malico, citrico ecc.), zuccheri, tannini, pectina, varie vitamine, glucosidi antocianici (mirtillina).
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Euphorbia verrucosa</i>	Euforbia verrucosaa	Giallo	perenne	25 - 50	8 - 15	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.200	Praterie, prati e pascoli aridi, più o meno pertosi, steppe, margini di boschi termofili.	Contiene un lattice biancastro tossico e caustico, in grado di causare forti irritazioni della bocca e dell'apparato digerente gastro-intestinale.
<i>Euphorbiaceae</i>	<i>Euphorbia cyparissias</i>	Euforbia cipressina	Giallo	perenne	15 - 40	8 - 12	indifferente	H±	4	N-	< 2.000	Praterie, prati e pascoli aridi, arbusteti e margini mesotermofili di boschi, campi, ambienti ruderali,...	Tutta la pianta contiene un lattice bianco, amaro e appiccicoso.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Vulneraria comune	Giallo	biennale perenne	15 - 40	14 - 18	indifferente	H±	5	N-	< 2.100	Praterie, prati e pascoli aridi, arbusteti e margini mesotermofili di boschi, campi, ambienti ruderali,...	In passato i fiori erano considerati rimedio per le ferite a causa del colore rosso cangiante dei boccioli floreali.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Astragalus alopecurus</i>	Astragolo coda di volpe	Giallo	perenne	50 - 100	15 - 20	indifferente	H±	3	N±	500 - 2.000	Praterie rase, prati, pascoli più o meno pietrosi e aridi, arbusteti mesotermofili	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Astragalus alpinus</i>	Astragalo alpino	Viola	perenne	5 - 12	9 - 12	Ca	H+	4	N±	1.000 - 2.700	Praterie alpine e sub-alpine.	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Colutea arborescens</i>	Colutea, vescicaria	Giallo	perenne	1 - 4 m	13 - 20	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.000	Arbusteti meso-termofili, boschi termofili, coltivati ornamentali.	In passato le foglie erano usate come lassativo.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Genista germanica</i>	Ginestra germanica	Giallo	arbusto	10 - 60	7 - 10	Si - Si/Ca	H-	4	N-	< 1.300	Margini erbacei dei boschi, arbusteti, boschi radi di latrifoglie.	Le parti verdi provocano vomito e diarrea; i semi contengono alcaloidi tossici caudati di salivazione e, in forti dosi, paralisi respiratoria.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Laburnum alpinum</i>	Maggiociondolo alpino	Giallo	albero	1 - 6 m	13 - 15	indifferente	H+	4	N-	< 1.400	Arbusteti e boschi radi meso-termofili e mesofili, ghiaie, detriti, pietraie.	Buona essenza forestale per il forte sviluppo delle radici che facilita il rimboschimento di scarpate e di terreni franosi..
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo comune	Giallo	albero	1 - 7 m	15 - 20	Ca - Si/Ca	H±	3	N±	< 1.200	Arbusteti e boschi radi meso-termofili e mesofili, ghiaie, detriti, pietraie.	Molto simile a quello alpino.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Lathyrus latifolius</i>	Cicerchia a foglie larghe	Viola	perenne	50 - 250	20 - 30	Ca	H+	5	N±	< 800	Margini di boschi e arbusteti mesotermofili, ambienti ruderali, prati e pascoli aridi.	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Lotus alpinus</i>	Loto dei prati, trifoglio giallo, ginestrino	Giallo	perenne	5 - 10	12 - 18	indifferente	H±	3	N±	1.500 - 2.500	Praterie rase alpine e subalpine (anche rocciose e/o pietrose), ghiaie, morene.	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Lotus corniculatus</i>	Ginestrino comune	Giallo	perenne	10 - 40	10 - 16	indifferente	H±	4	N±	< 2.000	Incolti, ambienti ruderali, ghiaie, morene, pietraie, praterie/prati/pascoli aridi, margini di boschi aridi.	In caso di lesioni la pianta rilascia acido cianidrico allontanando i predatori.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Medicago sativa</i>	Erba medica	Viola	perenne	30 - 90	8 - 10	indifferente	H+/H±	4	N±	< 1.200	Incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, prati e pascoli mesofili, coltivati.	Foraggera importata dall'Asia, fissatrice di Azoto.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Melilotus albus</i>	Meliloto bianco	Bianco	annua bienne	50 - 150	3 - 6	indifferente	H±	4	N±	< 1.600	Ambienti ruderali, sterrati, scarpate, cave di sabbia e ghiaia.	Meliloto essiccato contiene cumarina, se fermentato dicumarolo che riduce la coagulabilità del sangue e impiegato nei veleni per topi.

<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Onobrychis montana</i>	Lupinella montana	Viola	perenne	20 - 40	10 - 14	Ca	H+	4	N-	1.000 - 2.200	Praterie alpine e subalpine più o meno aride (anche rocciodse/petrose), ghiaie, morene, detriti, pietraie	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Pisum sativum</i>	Psello selvatico	Viola	annuale	20 - 200	20 - 30	indifferente	H±	4	N±	< 800	Amienti ruderali, ghiaie, detriti, pietraie, margini boschi termofili, arbusteti meso-termofili, coltivati.	Coltivata per i semi, consumata come alimento o utilizzata per il bestiame. Il termine designa il seme, ricco di amidi e proteine.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Robinia pseuacacia</i>	Robinia	Bianco	albero	25 m	10 - 20	indifferente	H±	3/4	N-	< 1.200	Arbusteti meso-termofili, boschi di pianura, rimboschimenti.	Specie esotica del Nord America.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Securigena varia</i>	Coronilla variegata, vezza salvadegua, securigena varia	Rosa	perenne	30 - 120	10 - 15	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.300	Margini erabecei meso.termofili dei boschi, srbusteti, ambienti ruderali, ghiaie, pietraie, praterie/pascoli/prati semiaridi.	È annoverata tra le piante velenose per la presenza in tutte le sue parti di un glucoside tossico, I+P166 catartina.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Trifolium alpinum</i>	Trifoglio alpino	Rosa	perenne	5 - 20	18 - 22	Si	H-	4	N-	1.200 - 2.500	Praterie alpine e subalpine, ambienti ruderali, rocce, sabbie, prati e pascoli mesofili, boschi di conifere.	
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Trifolium badium</i>	Trifoglio bruno	Giallo	perenne	5 - 25	10 - 15	Ca - Si/Ca	H+/H±	3	N±	800 - 2.500	Giaie, morene, detriti, pietraie, praterie rase alpine e subalpine, balme, rupi, prati e pascoli.	I fiori appassiti assumono colorazione marrone scuro.
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Trofolium pratense</i>	Trofolgio dei prati	Rosa	perenne	10 - 40	10 - 18	indifferente	H±	3	N±	< 1.200	Campi, colture, prati, pascoli, ambienti ruderali	Ottimo foraggio. Arricchisce il suolo di azoto
<i>Fabaceae Leguminosae</i>	<i>Vicia cracca</i>	Veccia cracca	Viola	perenne	20 - 120	10 - 12	indifferente	H±	3	N±	< 2.400	Tagli e rade forestali, prati e pascoli, margini dei boschi, arbusteti, boschi radi.	I semi sono molto graditi da alcuni uccelli.
<i>Fagaceae</i>	<i>Castanea sativa</i>	Castagno	Giallo	albero	30 m	100 - 300	indifferente	H+/H±	3	N±	400 - 11.200	Suoli e condizioni climatiche prive di eccessi.	
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana acaulis</i>	Genziana acaule	Blu	perenne	5 - 51	4 - 6	Si - Si/Ca	H-	3	N-	800 - 2.500	Praterie rase alpine e subalpine (più o meno rocciose e/o pietrose), ghiaie, morene, detriti, lande.	
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana bacarica</i>	Genziana bavarese	Blu	perenne	5 - 15	20 - 30	indifferente	H±	2	N-	1.200 - 2.700	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, balme, stillicidi, sorgenti, vallette nivali.	
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana campestris</i>	Genzianella campestre	Viola	annuale biennale	5 - 20	10 - 30	indifferente	H±	3	N-	600 - 2.500	Prati e pascoli magri più o meno umidi, frutteti, praterie artificiali e alpine e subalpine rase, anche rocciose.	
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana lutea</i>	Genziana maggiore	Giallo	perenne	50 - 120	30 - 40	Ca	H+	3	N±	400 - 2.000	Praterie rase alpine e subalpine anche rocciose e/o petrose, megaforbieti, balme, ghiaie, morene, lande, boscaglie.	Sostanze medicinali nelle radici molto amare.
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana punctata</i>	Genziana punteggiata	Giallo	perenne	20 - 60	20 - 35	Si	H-	3	N-	900 - 2.400	Praterie rase alpine e subalpine anche rocciose e/o pietrose, ghiaie, morene, detriti, pietraie, lande, megaforbieti,	Sostanze medicinali nelle radici molto amare.
<i>Gentianaceae</i>	<i>Gentiana schleicheri</i>	Genziana di Schleicher	Blu	perenne	3 - 6	1 - 2	Si/Ca	H±	3	N-	1.800- 2.800	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri, balme.	
<i>Geraniaceae</i>	<i>Erociium cicutarium</i>	Becco di gru cicutario	Viola	annua pluriannuale	3 - 40	10 - 15		H+	4	N±	< 1.300	Campi, colture, vigne, viti, incolti, ambienti ruderali e semiruderali, sentieri, sterrate, scarpate, rocce, sabbie.	Pianta commestibile; i giovani getti hanno un sapore simile al prezzemolo. Produce inoltre nettare e polline.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium columbinum</i>	Geranio colombino	Rosa	annuale biennale	15 - 40	12 - 18	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	< 1.300	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, praterie, prati, pascoli, margini dei boschi.	Il nome della specie deriva dal latino columbinum a causa della somiglianza delle foglie con le zampe del colombo.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium molle</i>	Geranio molle	Rosa	annua pluriannuale	5 - 30	8 - 10	indifferente	H±	4	N+	< 1.200	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini dei boschi, tagli forestali.	
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium nodosum</i>	Geranio nodoso	Rosa	perenne	20 - 40	20 - 30	indifferente	H±	3	N±	< 1.500	Arbusteti, siepi, margini dei boschi, boschi radi di latifoglie.	Il nome specifico si riferisce ai rigonfiamenti del fusto simili a nodi posti all'attacco delle foglie.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium pyrenaicum</i>	Geranio dei Pirenei	Rosa	perenne	20 - 60	12 - 18	indifferente	H±	3	N+	< 1.400	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, siepi, margini di boschi, prati e pascoli mesofili.	Originaria dei rilievi dell'Europa meridionale e diffusa nell'Europa centrale dal 1800 circa.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium robertianum</i>	Geranio di S. Roberto	Rosa	annuale biennale	20 - 50	15 - 20	indifferente	H±	3	N+	< 1.300	Ambienti ruderali, siepi, margini dei boschi, tagli e strade forestali, boschi radi di latifoglie, rupi.	Contiene tannino ed oli essenziali. Pianta officinale con proprietà diuretiche ed astringenti.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium sanguineum</i>	Geranio sanguigno	Rosso	perenne	30 - 50	25 - 40	Ca - Si/Ca	H±	4	N-	< 1.200	Margini di boschi termofili, arbusteti meso-termofili.	Rizoma ricco di tannini, anticamente come antiemorragico, anche contro virus influenzali.
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium sylvaticum</i>	Geranio selvatico, dei boschi	Viola	perenne	30 - 60	20 - 30	indifferente	H±	3	N+	500 - 1.700	Prati e pascoli mesofili e igrofilo, lande, megaforbieti, boschi di latifoglie, ambienti ruderali.	Anche se viene denominato geranio "dei boschi" in realtà predilige prati e pascoli.

<i>Globulariaceae</i>	<i>Globularia cordifolia</i>	Globularia a foglie cuoriformi	Blu	arbusto	3 - 10	10 - 20	Ca - Si/Ca	H+	4/5	N-	< 2.700	Rocce, sabbie, rupi, muri, balme, ghiaie, mortene, detriti, pietraie, praterie.	La pianta contiene un glucoside velenoso, la globularina e veniva utilizzata come potente lassativo.
<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	Iperico, erba di S. Giovanni	Giallo	perenne	20 - 70	20 - 25	indifferente	H±	3	N±	< 1.000	Prati, pascoli, praterie (anche più o meno rocciose e/o pietrose), margini di boschi, arbusteti.	Medicinale. Fiorisce nel giorno del santo.
<i>Iridaceae</i>	<i>Crocus albiflorus</i>	Croco bianco	Bianco	perenne	5 - 15	15 - 35	indifferente	H±	3	N+	400 - 2.200	Prati, praterie, pascoli mesofili più o meno eutrofici, boschi radi.	Fiori prevalentemente bianchi. Viola più raro.
<i>Iridaceae</i>	<i>Iris pseudacorus</i>	Giaggiolo acquatico	Giallo	perenne	50 - 100	60 - 80	indifferente	H±	1	N+	< 600	Acque lente, rive, stagni, fossi, paludi, pozze.	Velenosa. Irrita mucose. Diarrea con sangue.
<i>Juncaceae</i>	<i>Luzula nivea</i>	Luzona nivea	Bianco	perenne	40 - 90	8 - 10	indifferente	H-	3	N-	500 - 2.000	Tagli e schiarire fiorestali, lande, megaforbieti, arbusteti meso-termofili, boschi radi.	Infiorescenze brillanti quando bagnate dalla rugiada.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Ajuga reptans</i>	Bugola strisciante, erba di S.Lorenzo	Blu	perenne	8 - 30	10 - 17	indifferente	H±	3	N±	< 1.800	Siepi, margini dei boschi, tagli e schiarite fofestali, prati e pascoli mesofili, boschi radi.	Contiene sostanze contro la muta di insetti.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Ballota nigra</i>	Ballota fetida	Viola	perenne	30 - 100	10 - 15	indifferente	H±	3	N+	< 1.800	Ambienti ruderali, siepi, margini dei boschi, rupi, muri, balme.	Il nome volgare è docuto all'odore nauseabondo della pianta. Utilizzata contro disturbi gastrici e tosse in medicina popolare.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Calamintha nepeta</i>	Mentuccia	Rosa	perenne	30 - 80	10 - 16	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	< 1.200	Ghiaie, scivolamenti, pietraie, detriti, ruderi, margini dei boschi, arbusteti.	Aromatica tipica del clima mediterraneo. Proprietà digestive e cosmetiche sulla pelle; utilizzata in cucina è un saporito aromatizzante.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Clinopodium vulgare</i>	Clinopodio dei boschi	Viola	perenne	20 - 70	12 - 14	indifferente	H±	4	N-	< 1.200	Tagli, schiarite e strade forestali, margini di boschi termofili, arbusteti.	
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Lavandula angustifolia</i>	Lavanda a foglie strette	Blu	arbusto	30 - 100	9 - 12	indifferente	H±	4/5	N-	< 1.800	Rupi, muri, balme, praterie, pascoli e prati più o meno aridi e petrosi, arbusteti, siepi, margini dei boschi.	Frugale, facile da coltivare, dal caratteristico profumo.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Melittis melissophyllum</i>	Erba limona	Viola	perenne	20 - 60	30 - 45	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.200	Margini di boschi meso-termofili, arbusteti, pinete, gineprai, boschi radi di latifoglie.	La pianta ha diverse proprietà medicinali e le foglie secche possono essere usate per preparare un thè.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Prunella grandiflora</i>	Bocca di lupo	Blu	perenne	10 - 40	20 - 25	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N-	< 1.800	Praterie, prati e pascoli aridi, anche rocciosi e/o petrosi, incolti, margini dei boschi, boschi radi mesotermofili.	
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Prunella vulgaris</i>	Prunella/prunella comune	Rosa	perenne	5 - 20	10 - 15	indifferente	H±	3	N±	< 1.800	Parchi, tappeti erbosi, giardini, viali, prati e pascoli mesofili, campi, colture, schiarite forestali.	L'umidità rende i semi vischiosi permettendo ad essi di aderire, per esempio, alle suole delle scarpe.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino	Blu	perenne	30 - 120	10 - 12	Ca - Si/Ca	H+	4/5	N-	< 600	Rupi, muri, balme, praterie e pascoli aridi più o meno petrosi, coltivati.	Pianta officinale molto diffusa. Rinvenibile anche in Piemonte, ma quasi sempre coltivata e nelle zone ben esposte.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Salvia pratensis</i>	Salvia di Bertoloni, salvia selvatica	Blu	perenne	30 - 60	15 - 25	indifferente	H±/H+	4	N-	< 1.800	Praterie, prati e pascoli aridi, anche rocciosi e/o petrosi, incolti, ambienti ruderali.	
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Scutellaria alpina</i>	Scutellaria delle Alpi	Viola	perenne	10 - 30	23 - 25	Ca	H+	4	N-	500 - 2.400	Praterie rase alpine e subalpine, ghiaie, morene, pietraie, detriti, balme, pasoli aridi.	Il nome " <i>scutellaria</i> " deriva dal latino scutellum = scodella: borsa a per òa forma del suo calice.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Stachys officinalis</i>	Betonica comune, erba betonica	Viola	perenne	20 - 70	10 - 15	indifferente	H±	3	N±	< 1.200	Prati, pascoli, praterie, margini dei boschi, tagli e schiarite forestali, balme, lande, arbusteti, boschi radi.	In Veneto termine "betonica" = tutti gli usi.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Thymus praecox polytrichus</i>	Timo a peli variabili	Rosa	perenne	2 - 10	4 - 6	indifferente	H±/H+	4	N-	600 - 2.600	Rocce, sabbie, rupi, balme, ghiaie, morene, pascoli, prati, praterie rase (anche più o meno rocciose e/o pietrose)	Pianta aromatica.
<i>Lamiaceae Labiatae</i>	<i>Thymus praecox praecox</i>	Timo precoce	Viola	perenne	2 - 10	4 - 6	indifferente	H+	5	N-	< 2.400	Rocce, sabbie, rupi, balme, ghiaie, morene, pascoli, prati, praterie rase (anche più o meno rocciose e/o pietrose)	Pianta aromatica.
<i>Lauraceae</i>	<i>Laurus nobilis</i>	Lauro, alloro	Giallo	albero	1 - 6 m	10 - 20	Ca-Si/Ca	H±	4	N-	< 600	Querceti e ostrieti sempre verdi mediterranei e submediterranei, boschi di latifoglie termofili	Le foglie sono usate in cucina per aromatizzare e per tisane.
<i>Lentibulariaceae</i>	<i>Pinguicula alpina</i>	Pinguicola alpina	Bianco	perenne	6 - 12	10 - 15	Ca - Si/Ca	H+	2	N-	1.000 - 2.400	Sorgenti, stillicidi, rive di ruscelli, cascate, torbiere.	Pianta carnivora
<i>Lentibulariaceae</i>	<i>Pinguicula arvetii</i>	Pinguicola di Arvet-Touvet	Bianco	perenne	5 - 15	20 - 28	Ca	H+	2	N-	1.000 - 2.400	Sorgenti, stillicidi, rive di ruscelli, cascate, praterie umide.	Pianta carnivora
<i>Lentibulariaceae</i>	<i>Pinguicula leptoceras</i>	Pinguicola a sperone stretto	Blu	perenne	5 - 15	15 - 25	indifferente	H+	2	N-	1.000 - 2.400	Sorgenti, stillicidi, rive di ruscelli, cascate, torbiere.	Pianta carnivora

<i>Lentibulariaceae</i>	<i>Pinguicula vulgaris</i>	Pinguicola comune	Viola	perenne	5 - 51	15 - 22	Ca-Si/Ca	H+	2	N-	< 2.000	Sorgenti, stillicidi, rive di ruscelli, cascate, torbiere.	Pianta carnivora
<i>Liliaceae</i>	<i>Allium ursinum</i>	Aglione orsino	Bianco	perenne	15 - 40	12 - 22	indifferente	H+	2	N+	< 1.200	Siepi e margini freschi di boschi, balme, boschi di latifoglie.	Odore intenso. Contro inappetenza, ipertensione, arteriosclerosi.
<i>Liliaceae</i>	<i>Allium lusitanicum</i>	Aglione montano, aglione del Portogallo	Viola	perenne	10 - 50	4 - 7	indifferente	H±/H+	4/5	N-	< 2.200	Affioramenti rocciosi, sabbie, rupi, muri, balme, praterie e pascoli aridi, ghiaie, detriti, pietraie.	Si tratta di una specie endemica tipica del Piemonte e delle Alpi Liguri (Alpi Marittime, Cozie e Grazie meridionali).
<i>Liliaceae</i>	<i>Allium narcissiflorum</i>	Aglione a fiori di narciso	Viola	perenne	10 - 40	10 - 18	Ca	H+	3	N-	500 - 2.100	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, muri, balme.	
<i>Liliaceae</i>	<i>Anthericum liliago</i>	Liliosfodelo maggiore	Bianco	perenne	30 - 60	30 - 50	indifferente	H±	4/5	N-	< 1.800	Praterie, pascoli, prati aridi più o meno petrosi.	Specie molto simile all' <i>A. ramosum</i> .
<i>Liliaceae</i>	<i>Anthericum ramosum</i>	Liliosfodelo minore	Bianco	perenne	40 - 90	15 - 25	indifferente	H+	4	N+	< 1.201	Praterie, prati e pascoli aridi più o meno rocciosi, margini di boschi meso-termofili, arbusteti termofili.	Specie molto simile all' <i>A. liliago</i> .
<i>Liliaceae</i>	<i>Colchicum alpinum</i>	Colchico alpino	Bianco	perenne	5 - 20	25 - 45	Si	H-	3	N±	500 - 2.000	Prati e pascoli mesofili, praterie rase alpine e subalpine (anche rocciose e/o pietrose).	Talora i fiori assumono una colorazione rosata. Presente unicamente nelle Alpi occidentali.
<i>Liliaceae</i>	<i>Convallaria majalis</i>	Mughetto	Bianco	perenne	10 - 25	5 - 7	Ca - Si/Ca	H±	4	N±	< 2.000	Boschi prevalentemente di latifoglie. Diffusa in parte in numerosi ambienti.	Proprietà medicinali per insufficienze cardiache.
<i>Liliaceae</i>	<i>Erythronium dens-canis</i>	Dente di cane	Viola	perenne	10 - 20	15 - 50	indifferente	H±	3	N±	< 1.300	Margini erbacei dei boschi, arbusteti, boschi radi di latifoglie.	Il nome specifico allude alla forma del bulbo, simile al dente di un cane.
<i>Liliaceae</i>	<i>Gagea feagifera</i>	Cipollaccio giallo fistoloso	Giallo	perenne	5 - 15	18 - 30	indifferente	H±	3	N+	800 - 2.600	Riposi del bestiame, balme, prati, pascoli, praterie artificiali.	
<i>Liliaceae</i>	<i>Lilium bulbiferum croceum</i>	Giglio rosso, di S. Giovanni	Rosso	perenne	30 - 80	60 - 80	indifferente	H±	5	N±	< 2.000	Rupi, balme, rocce, praterie e pascoli aridi (più o meno rocciose e/o pietrose), margini di boschi, arbusteti.	
<i>Liliaceae</i>	<i>Lilium martagon</i>	Giglio martagone	Rosa	perenne	40 - 100	30 - 60	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 2.000	Megaforbieti, popolamenti a felci, ontaneti, saliceti, boschiglie di pini, boschi di latifoglie.	Profumo intenso verso sera. Boccioni appetiti dai caprioli. Foglie e fiori mangiati dalla Criocera (coleottero infestante).
<i>Liliaceae</i>	<i>Muscari comosum</i>	Muscari chiomato, cipollaccio, lampascione	Viola	perenne	15 - 70	5 - 9	indifferente	H±	4	N±	< 1.200	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, rocce, sabbie, rupi, balme, praterie e pascoli aridi.	Molti ambienti favorevoli alla specie sono a rischio per la lavorazione intensiva e profonda dei suoli.
<i>Liliaceae</i>	<i>Muscari racemosum</i>	Muscari racemoso	Blu	perenne	10 - 20	4 - 5	indifferente	H±	4	N±	< 1.200	Campi, colture, vigne, incolti, praterie, pascoli aridi, pietraie, margini di boschi termofili.	
<i>Liliaceae</i>	<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Latte di gallina comune	Bianco	perenne	10 - 30	30 - 40	indifferente	H+	3	N+	< 2.000	Campi, colture, incolti, siepi, margini di boschi, perchi, tappeti erbosi, prati, pascoli, praterie.	I bulbi contengono glicosidi cardioattivi.
<i>Liliaceae</i>	<i>Paradisea liliastrum</i>	Paradisica, giglio di monte	Bianco	perenne	30 - 60	40 - 60	indifferente	H±	3	N±	500 - 2.000	Prati e pascoli mesofili, praterie rase alpine e subalpine (anche rocciose e/o pietrose).	
<i>Liliaceae</i>	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Sigillo di Salomone multifloro	Bianco	perenne	20 - 80	15 - 20	indifferente	H±	3	N±	< 1.200	Siepi e margini freschi di boschi, balme, boschi di latifoglie.	Gli steli morti lasciano cicatrici simili per forma ad anelli paragonati agli anelli di Salomone (culture ebraica e araba).
<i>Liliaceae</i>	<i>Tulipa pumila/sylvestris</i>	Tulipano montano	Giallo	perenne	15 - 40	30 - 60	indifferente	H±	4	N±	600 - 2.100	Praterie, prati, pascoli steppe più o meno aride e più o meno pietrose.	
<i>Lythraceae</i>	<i>Lythrum salicaria</i>	Salicella comune, coda rossa	Rosa	perenne	40 - 120	10 - 14	indifferente	H±	2	N±	< 600	Bordi di zone umide, ambienti temporaneamente inondati, prati e pascoli igrofili, megaforbieti.	Ciascuna pianta possiede un solo dei diversi tipi di fiori (diversi per dimensioni dell'apparato riproduttore). Ciò facilita lo scambio genetico.
<i>Malvaceae</i>	<i>Althaea cannabina</i>	Altea cannabina, malva cannabina	Rosa	perenne	50 - 80	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	3/2	N±	< 600	Ambienti umidi, campi, colture, incolti, ambienti ruderali.	Il nome cannabina fa riferimento alla fibra vegetale, simile alla canapa che fece sì che questa pianta venisse coltivata in passato per scopi tessili.
<i>Malvaceae</i>	<i>Malva acea</i>	Malva acea	Rosa	perenne	40 - 100	50 - 60	Ca - Si/Ca	H+	3	N+	< 1.400	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini dei boschi, arbusteti.	Antico impiego come pianta curativa.
<i>Malvaceae</i>	<i>Tilia cordata</i>	Tiglio	Bianco	albero	5 - 30 m	8 - 14	indifferente	H±	4	N-	< 1.200	Carpineti, querceti mesofili, quercopineti meso-termofile continentali, betuleti, castagneti, acereti, tiglieti, frassineti.	Albero frequentemente utilizzato per viali alberati e giardini. Profumo intenso durante la fioritura.
<i>Myrtaceae</i>	<i>Leptospermum scoparium</i>	Manuka	Bianco	perenne	50 - 250	5 - 8	indifferente	H±	3	N±	< 600	Giardini, talora presente come specie diffusa da coltivi artificiali.	Ornamentale alloctona dalla Nuova Zelanda, adatta per la produzione di miele.

<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum lucidum</i>	Ligustro lucido, del Giappone	Bianco	arbusto albero	1 - 10 m	5 - 8	indifferente	H±	3	N±	< 800	Coltivi ornamentali.	Pianta alloctona del Sud Est asiatico.
<i>Oleaceae</i>	<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro	Bianco	arbusto	50 - 300	4 - 6	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N-	< 1.401	Arbusteti meso-termofili, pinete, gineprai, boschi radi di latifoglie.	Bacche invcernali gradite agli uccelli. Sopporta bene le potature, quindi adatto per formazione di siepi.
<i>Oleaceae</i>	<i>Forsythia</i> ssp.	Forsizia	Giallo	arbusto	3 m	10 -20	indifferente	H±	3	N±	< 1.000	Suoli e condizioni climatiche prive di eccessi.	Pianta esotica (Cina, Giappone, Corea,...), ampiamente utilizzata nei giardini pubbliche e privati. Genere comprendente numerose specie.
<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium anagallidifolium</i>	Epilobio con foglie anagallidi	Rosa	perenne	3 - 10	3 - 5	Si	H-	2	N-	1.800 - 2.600	Zone umide, sorgenti, stillicidi, cascate, torbiere.	
<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium angustifolium</i>	Cemenerio, epilobio, gambirossi	Rosa	perenne	50 - 200	20 - 25	indifferente	H±	3	N+	500 - 2.100	Tagli, piste e schiarite forestali, ghiaie, morene, detriti, megaforbieti, incolti, ambienti ruderali.	Può formare migliaia di semi volanti fino a 10 km.
<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium fleischeri</i>	Epilobio di Fleicher	Viola	perenne	10 - 40	25 - 30	indifferente	H±	3	N±	600 - 2.700	Ggiaie, morene, detriti, pietraie, praterierase alpine, boschi radi di conifere.	
<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium hirsutum</i>	Epilobio irsuto/maggiore	Rosa	perenne	50 - 180	15 - 20	indifferente	H±	2	N+	< 1.200	Zone umide, megaforbieti, bordi di ruscelli, ontaneti, pioppeti, saliceti.	Semi leggeri, galleggianti sull'acqua.
<i>Onagraceae</i>	<i>Epilobium tetragonum</i>	Epilobio a quattro angoli	Rosa	perenne	30 - 80	4 - 6	indifferente	H±	3	N±	< 1.400	Zone umide,megaforbieti, ruscelli, ambienti ruderali.	Granelli di polline riuniti in gruppi di quattro tenuti insieme da filamenti appiccicosi.
<i>Onagraceae</i>	<i>Oenothera biennis</i>	Enotera comune, rapunzia	Giallo	biennale	50 - 150	30 - 50	indifferente	H±	4	N±	< 600	Zone più o meno aride, incolti, cave di ghaiaia, ambienti ruderali	Specie esotica del Nord America.
<i>Ophioglossaceae</i>	<i>Botrychium lunaria</i>	Botrichio lunaria	Giallo	perenne	20 - 30	20 - 60	Si - Si/Ca	H±	3	N-	900 - 2.300	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, praterie, prati e pascoli più o meno pietrosi/rocciosi.	
<i>Orchidaceae</i>	<i>Cephalanthera longifolia</i>	Cefalantera a foglie lunghe, maggiore	Bianco	perenne	15 - 60	12 - 18	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	< 1.200	Pinete, gineprai, boschi termofili di latifoglie.	
<i>Orchidaceae</i>	<i>Dactylorhiza maculata</i>	Orchidea machiata	Rosa	perenne	15 - 60	10 - 15	infifferente	H±	3	N-	< 2.400	Tagli, schiarite, strade forestali, praterie e pascoli, margini dei boschi.	
<i>Orchidaceae</i>	<i>Dactylorhiza sambucina</i>	Orchidea sambucina	Giallo Rosso	perenne	10 - 30	5 - 10	indifferente	H-	5	N-	< 2.100	Praterie, prati e pascoli aridi, più o meno pietrosi/rocciosi.	Può presentare due colorazioni nette: giallo e rosso.
<i>Orchidaceae</i>	<i>Dactylorhiza cruenta</i>	Orchidea sanguigna	Viola	perenne	15 - 30	10 - 12	Ca	H+	1/2	N-	800 - 2.000	Sorgenti, stillicidi, cascate, bordi di ruscelli, torbiere, prati e pascoli igrofili.	
<i>Orchidaceae</i>	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Orchidea a foglie larghe	Viola Rosa	perenne	15 - 50	10 - 15	Ca - Si/Ca	H±	1/2	N±	500 - 2.200	Sorgenti, stillicidi, ruscelli, cascate, torbiere, prati e pascoli igrofili.	L'infuso di foglie raccolte d'estate ha proprietà astringenti; l'infuso per uso esterno serve per gargarismi, sciacqui e irrigazioni.
<i>Orchidaceae</i>	<i>Nigritella cenisia</i>	Nigritella del Moncenisio	Rosso	perenne	10 - 30	5 - 10	Ca - Si/Ca	H±	3	N-	1.400 - 2.400	Praterie alpine e subalpine, piu o meno petrose.	
<i>Orchidaceae</i>	<i>Orchis mascula</i>	Orchidea maschio	Viola	perenne	20 - 60	15 - 20	Ca - Si/Ca	H±	3	N±	< 2.200	Praterie, prati e pascoli più o meno aridi, più o meno mesofili, più o meno rocciosi e/o pietrosi, arbusteti.	Endemica della Alpi piemontesi e lombarde occidentali. Portamente vigoroso. Rizotuneri simili a testicoli.
<i>Orchidaceae</i>	<i>Traunsteinera globosa</i>	Orchidea globosa	Rosa	perenne	20 - 60	20 - 30	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	500 - 2.100	Prato e pascoli mesofili ± eutrofici, frutteti, praterie artificiali e alpine ± rocciose.	La denominazione " <i>Traunsteinera</i> " commemora il farmacista austriaco Joseph Traunstein.
<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis corniculata</i>	Acetosella cornicolata	Giallo	perenne	3 - 30	5 - 10	indifferente	H±	4	N+	< 800	Colture, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, parchi, giardini, frutteti, piantagioni.	Alloctona, presente in gran parte del pianeta.
<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis strict</i>	Acetosella delle fonti	Giallo	perenne	5 - 40	5 - 10	indifferente	H±	3	N+	< 800	Incolti, ambienti ruderali, parchi, giardini, frutteti.	Alloctona dal Nord-America.
<i>Papaveraceae</i>	<i>Chelidonium majus</i>	Erba porraia, celidonia	Giallo	perenne	30 - 80	15 - 20	indifferente	H±	3	N+	400 - 1.200	Ambienti ruderali, siepi, margini dei boschi, parchi, tappetui erbosi, giardini,...	Presenza di alcaloidi nel lattice della pianta utili per malattie epatobiliari. La medicina popolare consiglia di versare il lattice sui porri.
<i>Papaveraceae</i>	<i>Papaver rhoeas</i>	Papavero comune, rosolaccio	Rosso	annuale biennale	30 - 70	40 - 70	indifferente	H±	4	N±	< 1.000	Campi, colture, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, zone aride, parchi, giardini.	Questa pianta contiene alcaloidi, non oppio. Ogni fioreproduce circa 2,5 milioni di granuli di polline
<i>Paeonoaceae</i>	<i>Peonia</i> sp.	Peonia	Rosso	perenne	50 - 10	80 - 130	Ca - Si/cCa	H+	4	N±	< 1.400	Margini dei boschi, arbusteti, tagli forestali, piste, boschi radi termofili (pinete, gineprai, latifogle)	Assente come spomteana in Piemonte, ma molto diffusa nelle diverse varietà cultivar

<i>Phytolaccaceae</i>	<i>Phytolacca americana</i>	Fitolacca americana	Rosa	perenne	1 - 3 m	4 - 8	indifferente	H±	3	N+	< 400	Arbusteti meso-termofili, ambiente ruderali, boschi radi di latifoglie.	Utilizzata, nonostante la sua tossicità, a scopo ornamentale, ad uso alimentare, cosmetologico, farmacologico e medicinale.
<i>Pinaceae</i>	<i>Abies alba</i>	Abete bianco	Giallo	albero	20 - 50 m	10 - 20	indiferente	H-/H±/H+	2	N±	400 - 1.800	Boschi vari di conifere, faggete, impianti, ornamentale.	Legno leggero, bianco e resistente; di mediocre qualità utilizzato nelle cartiere, in carpenteria e in falegnameria.
<i>Pinaceae</i>	<i>Larix decidua</i>	Larice	Rosso	perenne	20 - 40 m	20 - 40	Si - Si/Ca	H±/H+	3	N±/N-	1.000 - 2.200	Ampiamente diffuso nelle Alpi, in particolare in quelle occidentale dove forma lariceti puri assai estesi.	In Italia è l'unica pinacea caducifolia.
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Linaria alpina</i>	Linaria alpina	Viola	annua, biennale, perenne	5 - 15	15 - 20	indifferente	H±/H+	4	N-	1.600 - 2.800	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri, balme.	
<i>Plantaginaceae</i>	<i>Plantago media</i>	Piantagine media	Rosa	perenne	10 - 50	20 - 80	indifferente	H±/H+	4	N-	< 1.500	Praterie, prati e pascoli aridi, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate.	<i>Plantago</i> = "pianta del piede" per le foglie simili a orme e perché la pianta sopporta bene il calpestio.
<i>Plumbaginaceae</i>	<i>Armeria alpina</i>	Armeria alpina, spillone alpino	Rosa	perenne	7 - 25	18 - 26	Si - Si/Ca	H-	4	N-	1.800 - 2.800	Praterie alpine e sub-alpine, rupi, balme, ghiaie, morene.	
<i>Poligonaceae</i>	<i>Polygonum alpinum</i>	Poligono alpino	Bianco	perenne	30 - 70	2 - 6	Si - Si/Ca	H-	3	N+	1.000 - 2.400	Prati e pascoli mesofili più o meno eutrofici, lande, megaforbieti, arbusteti, boscaglie, boschi di conifere.	
<i>Poligonaceae</i>	<i>Polygonum bistorta</i>	Poligono bistorta, serpentaria	Rosa	perenne	30 - 90	4 - 6	indifferente	H±	2	N+	400 - 1.900	Prati e pascoli mesofili e igrofili, bordi di ruscelli, megaforbieti, ontaneti, saliceti.	Pianta ricca di tannino, un tempo impiegata contro la diarrea ed il veleno dei serpenti
<i>Poligonaceae</i>	<i>Polygonum viviparum</i>	Poligono viviparo	Bianco	perenne	5 - 30	2 - 4	indifferente	H±	3	N-	500 - 2.100	Praterie alpine e subalpine, prati e pascoli mesofili, boschi e boscaglie rade.	
<i>Polygalaceae</i>	<i>Polygala vulgaris</i>	Poligala comune	Rosa	perenne	10 - 30	6 - 9	indifferente		3	N-	< 1.200	Steppe, praterie e pascoli aridi più o meno petrose.	Genere molto diffuso con oltre 500 specie nel mondo.
<i>Portulacaceae</i>	<i>Portulaca oleracea</i>	Porcellana comune	Giallo	annuale	10 - 30	4 - 6	indifferente	H±	4	N+	< 1.200	Colture, ambienti ruderali, parchi, tappeti erbosi, giardini, viali, cimiteri, terreni sportivi.	Conosciuta, fin dall'antico Egitto, come ortaggio e pianta curativa. Ogni fiore schiude solo per una mattina.
<i>Primulaceae</i>	<i>Androsace obtusifolia</i>	Androsace a foglie ottuse, gelsomino di montagna	Bianco	perenne	2 - 10	6 - 9	Si	H-	4	N-	1.600 - 2.700	Praterie alpine e sub-alpine.	
<i>Primulaceae</i>	<i>Androsace vitaliana</i>	Vitaliana, primula d'oro, androsace gialla	Giallo	perenne	1 - 4	8 - 14	Si - Si/Ca	H±	3	N-	1.800 - 2.700	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, ruderi, praterie rase alpine e subalpine.	
<i>Primulaceae</i>	<i>Cortusa matthioli</i>	Cortusa di Matthioli	Rosa	perenne	20 - 40	7 - 12	Ca - Si/Ca	H+	2	N±	800 - 2.100	Ontaneti e saliceti subalpini, zone umide, megaforbieti, boschi di conifere.	
<i>Primulaceae</i>	<i>Cyclamen purpurascens</i>	Ciclamino delle Alpi	Rosa	perenne	5-12	18-25	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 1.000	Boschi di latifoglie.	I tuberi del ciclamino sono molto tossici per la presenza di saponine.
<i>Primulaceae</i>	<i>Primula acaulis</i>	Primula comune, primavera, occhio di civetta	Giallo	perenne	5 - 10	20 - 30	indifferente	H±	3	N±	< 1.500	Margini dei boschi, boschi radi di latifoglie, coltivi ornamentali, parchi, giardini, prati e pascoli	Molte varietà cultivar diversamente colorate
<i>Primulaceae</i>	<i>Primula elatior</i>	Primula maggiore	Giallo	perenne	10 - 30	15 - 20	indifferente	H±	3	N±	< 1.800	Prati e pascoli mesofili, arbusteti torbosi, boschi radi di latifoglie, praterie alpine e subalpine.	
<i>Primulaceae</i>	<i>Primula hirsuta</i>	Primula irsuta	Viola	perenne	3 - 10	15 - 25	Si	H+	3	N-	1.500 - 3.000	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri, praterie alpine e subalpine.	
<i>Primulaceae</i>	<i>Primula latifolia</i>	Primula viscosa	Rosa	perenne	5 - 15	10 - 15	Si	H-	3	N-	1.200 - 2.500	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, rupi, muri, praterie alpine e subalpine.	Foglie tutte basali e in rosetta, a contorno obovato, odorose (odore acre, piuttosto sgradevole e simile a quello del sudore umano).
<i>Primulaceae</i>	<i>Primula pedemontana</i>	Primula piemontese	Rosa	perenne	7 - 15	15 - 25	Si	H-	3	N-	1.500 - 2.500	Rupi, muri, rocce, ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie alpine e subalpine.	Endemismo ristretto delle Alpi occidentali.
<i>Primulaceae</i>	<i>Soldanella alpina</i>	Soldanella alpina	Blu	perenne	5 - 15	8 - 13	indifferente	H±	2	N±	900 - 2.900	Praterie più o meno rocciose, vallette nivali, ghiaie, morene, detriti, torbiere, lande.	L'arrossamento del fusto migliora l'assorbimento del calore solare: consente la perforazione dell'eventuale strato di neve al suolo.
<i>Pyrolaceae</i>	<i>Pyrola rotundifolia</i>	Piroletta a foglie rotonde	Bianco	perenne	15 - 35	8 - 13	indifferente	H±	3	N-	900 - 2.300	Boscaglie, boschi di conifere, pioppeti, ontaneti, frassineti e saliceti.	200.000 semi per il peso di 1 g, si disperdono facilmente con poco vento e germigliano con l'aiuto di un fungo. Pianta rara.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Aconitum napellus</i>	Acconito napello	Blu	perenne	20 - 170	20 - 30	indifferente	H±	2	N+	800 - 2.200	Megaforbieti, popolamenti a felci, riposi del bestiame, prati e pascoli mesofili/nitrofilo, praterie.	Pianta velenosa, un tempo considerata come "arsenico vegetale".

<i>Ranunculaceae</i>	<i>Anemone narcissiflora</i>	Anemone con fiori di narciso	Bianco	perenne	20 - 50	20 - 30	Ca	H±/H+	3	N±	1.200 - 2.100	Praterie alpine e subalpine anche più o meno rocciose e/o pietrose, megaforbieti, boscaglie di pini.	Relitto glaciale fuori dalle Alpi.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Anempne nemorosa</i>	Anemone dei boschi, bianca	Bianco	perenne	7 - 25	20 - 30	indifferente	H±	3	N±	< 1.200	Boschi di latifoglie, praterie, prati e pascoli, arbusteti.	La linfa della pianta contiene protoanemonina, in grado di provocare infiammazioni cutanee.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Aquilegia alpina</i>	Aquilegia alpina, aquilegia maggiore	Blu	perenne	15 - 80	50 - 70	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N±	800 - 2.000	Tagli eschiarite forestali, praterie alpine e subalpine più o meno pietrose, rupi, ghioie, morene.	Pianta officinale.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Aquilegia atrata</i>	Aquilegia nerastra	Mrrone	perenne	40 - 80	30 - 40	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N±	< 2.000	Tagli e schiarite forestali, margini dei boschi, boschi e arbusteti radi.	Contiene sostanza velenose per l'uomo. Innocua come foraggera.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Caktha palustris</i>	Calta palustre	Giallo	perenne	10 - 50	25 - 40	indifferente	H±	2	N±	< 2.100	Sorgenti, stillicidi, ruscelli, cascate, torbiere, prati e pascoli igrofili.	In passato i fiori, ricchi di carotenoidi, erano usati per colorare il burro di giallo.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Clematis terniflora</i>	Dolce clematide	Bianco	perenne	50 - 300	10 - 15	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 1.000	Terreni diversi in esposizione sole-mezzombra. Pianta rustica.	Pianta ornamentale invasiva. Originaria Asia Nord orientale.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Clematis vitalba</i>	Clematide vitalba, viorna	Bianco	Arbusto nano	2 - 10 m	20 - 25	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N±	< 1.200	Margini dei boschi meso-termofili, arbusteti, saliceti, pioppeti, ontaneti, frassineti.	Infestante il cui uso richiede accortezza. Ha un effetto potenzialmente tossico e irritante sul nostro organismo.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Helleborus foetidus</i>	Elleboro puzzolente	Verde	perenne	30 - 60	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N±	< 1.200	Mrgini dei boschi meso-termofili, tagli e piste forestali, arbusteti, boschi radi di latifoglie.	Rizoma e radici contenenti saponine tossiche. Parti aeree contenenti protoanemonina (irritante).
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Hepatica nobilis</i>	Anemone fegatella, erba trinità	Viola	perenne	5 - 15	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	5	N-	< 2.000	Boschi di conifere e di latifoglie	Fiori si chiudono con poca luce. Per la forma delle foglie simile al fegato, nel medio evo la pianta era usata contro le malattie epatiche.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Pulsatilla alpina</i>	Anemone delle Alpi Cozie	Bianco	perenne	20 - 70	70 - 90	Si	H±	3	N-	1.800 - 2.200	Praterie, lande, boschi radi di conifere.	La pianta contiene alcaloidi ed è tossica per l'uomo.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Pulsatilla vernalis</i>	Anemone primaverile	Bianco	perenne	5 - 15	40 - 60	indifferente	H-	4	N-	1.000 - 2.700	Praterie rase alpine e subalpine, lande.	" <i>Pulsatilla</i> " dal latino "pulsare", dei fiori che dondolando sotto l'azione del vento. " <i>Vernalis</i> " significa periodo primaverile precoce di fioritura.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus ficaria</i>	Ranuncolo favallo	Giallo	perenne	50 - 30	20 - 25	indifferente	H±	2	N+	< 1.200	Arbusteti e boschi radi di latifoglie, colture, frutteti, prati/pascoli mesofili	
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus kuepferi</i>	Ranuncolo di Kupfer	Bianco	perenne	5 - 20	20 - 25	Si	H-	3	N-	1.000 - 2.500	Praterie alpine e subalpine, prati e pascoli magri, lande.	
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Ranuncolo bulboso	Giallo	perenne	10 - 50	20 - 30	indifferente	H±/H+	4	N-	< 1.200	Praterie, prati, pascoli e ambienti petrosi; condizioni di moderata aridità.	Le radici, più o meno carnose, immagazzinano sostanze nutritive di riserva.
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus glacialis</i>	Ranuncolo dei ghiacciai	Bianco	perenne	5 - 20	15 - 30	Si	H-	2	N-	1.700 - 2.800	Ghiaie, detriti, pietraie, morene, rupi, balme, rocce.	
<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus montanus</i>	Ranuncolo montano	Giallo	perenne	5 - 40	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	3	N+	600 - 2.500	Prati e pascoli mesofili, praterie artificiali, alpine e subalpine, ghiaie, morene, pietraie, megaforbieti, boscaglie.	
<i>Resedaceae</i>	<i>Reseda lutea</i>	Reseda gialla	Giallo	annua pluriannuale	20 - 50	5 - 7	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N+	< 1.600	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, zone aride	Contiene pigmenti gialli usati come coloranti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Crataegus monogyna</i>	Biancospino comune	Bianco	arbusto	6 m	10 - 15	indifferente	H±/H+	3	N-	< 1.200	Arbusteti mesotermofili, incolti, boschi radi di conifere e soprattutto di latifoglie.	Utile per formazione di siepi.
<i>Rosaceae</i>	<i>Dryas octopetala</i>	Camedrio alpino	Bianco	perenne	2 - 10	30 - 40	Ca - Si/Ca	H+	4	N-	1.000 - 2.500	Rupi, balme, rocce, praterie alpine e subalpine, boscaglie di pini, boschi radi di conifere.	Il termine " <i>octopetala</i> " significa "otto petali", ma alcuni fiori hanno dieci petali.
<i>Rosaceae</i>	<i>Duchesnea indica</i>	Fragola matta	Giallo	perenne	20 - 50	10 - 18	indifferente	H±	3	N+	< 600	Siepi, margini dei boschi, tagli e schiarite forestali, parchi, tappeti erbosi, prati e pascoli mesofili, coltivati.	Pianta esotica importata nell'800 a Torino
<i>Rosaceae</i>	<i>Filipendula ulmaria</i>	Filipendula olmaria, regina dei prati	Bianco	perenne	50 - 150	4 - 10	indifferente	H±	2	N+	< 1.800	Zone umide, bordi di ruscelli, torbiere, prati e pascoli igrofili, arbusteti torbosi, ontaneti, saliceti, frassineti.	Fiori contenenti salicilati e flavonoidi per la febbre.
<i>Rosaceae</i>	<i>Filipendula vulgaris</i>	Filipendula comune, piperita	Bianco	perenne	30 - 80	10 - 16	Ca	H±	4	N-	< 1.200	Praterie e pascoli più o meno aridi e rocciosi, margini dei boschi meso-termofili, arbusteti, boschi radi.	Radici rigonfie e tuberose, anche commestibili.
<i>Rosaceae</i>	<i>Fragaria vesca</i>	Fragola comune	Bianco	perenne	5 - 20	10 - 15	indifferente	H±	3	N±	<1.600	Radure, margini boschivi, boschi radi.	Piccoli frutti commestibili. Le cultivar producono frutti molto più grandi per il mercato ortofrutticolo.

<i>Rosaceae</i>	<i>Geum montanum</i>	Cariofillata montana	Giallo	perenne	10 - 30	25 - 35	indifferente	H-	3	N-	1.000 - 2.500	Praterie alpine e subalpine, lande, ghiaie, morene, pietraie, prati e pascoli mesofili, megaforbieti, boschi radi.	
<i>Rosaceae</i>	<i>Geum urbanum</i>	Geo urbano, Beniute comune, cariofillata comune	Giallo	perenne	20 - 100	10 - 15	indifferente	H±	3	N-	< 1.400	Siepi, margini dei boschi, sentieri, margini di ruscelli, arbusteti, boschi radi.	Anch detta "erba benedetta": espressione, secondo alcuni, legata al fatto che veniva coltivata soprattutto dai benedettini nei loro monasteri.
<i>Rosaceae</i>	<i>Malus domestica</i>	Melo comune	Bianco	perenne	10 m	20 - 40	indifferente	H±/H+	3	N±	< 1.200	Coltivi su versanti collinari e pedemontani ben esposti o su alta pianura alluvionale	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla aurea</i>	Potentilla dorata	Giallo	perenne	5 - 20	15 - 20	Si - Si/Ca	H-	3	N-	1.000 - 2.300	Praterie alpine e subalpine, lande, boschi radi di conifere.	La colorazione gialla brillante ha contribuito anche alla denominazione "cinquefoglia fior d'oro"
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla grandiflora</i>	Potentilla a fiori grandi	Giallo	perenne	20 - 40	20 - 30	Si - Si/Ca	H-	4	N±	600 - 2.700	Praterie rase alpine e subalpine più o meno rocciose, rupi, muri, balme, prati e pascoli più o meno aridi.	Il nome " <i>potentilla</i> " dal latino " <i>potens</i> " = forte, potente, per il potere terapeutico di queste piante. Il nome specifico indica i grandi fiori.
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla micrantha</i>	Potentilla a fiori piccoli	Bianco	perenne	5 - 15	9 - 14	indifferente	H±	4	N±	< 1.300	Tagli e strade forestali, schiarite, boschi radi a latifoglie.	Viene talvolta confusa con la fragola comune, soprattutto per la somiglianza delle foglie.
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla nivea</i>	Potentilla nivea	Giallo	perenne	5 - 15	10 - 20	Ca - Si/Ca	H±	4	N+	1.000 - 2.800	Praterie rase alpine e subalpine, Ghiaie, morene, pietraie, detriti, balme.	
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla pusilla</i>	Potentilla minuscola	Giallo	perenne	5 - 15	10 - 15	indifferente	H±	5	N-	< 1.800	Praterie, prati, pascoli aridi più o meno pietrosi, ambienti ruderali, rocce, sabbie, rupi, muri, boschi radi termofili.	
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla rupestris</i>	Potentilla rupestre	Bianco	perenne	20 - 60	14 - 20	Si	H-	4	N±	< 1.500	Praterie, pascoli, prati ± aridi e ± pietrosi, margini di boschi termofili.	
<i>Rosaceae</i>	<i>Potentilla reptans</i>	Potentilla striscian, cinque fogliate	Giallo	perenne	10 - 20	15 - 20	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Ambienti umidi (o parzialmente inondati), campi, colture, incolti, ambienti ruderali, prati e pascoli mesofili-	Contro dirrea in medicina popolare. Ricoprente.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus dulcis</i>	Mandorlo	Bianco	albero	10 m	30 - 40	indifferente	H±	4	N±	< 700	Specie frugale adatta anche su substrati aridi, poveri e sassosi, ma teme gelo e vento.	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco	Bianco	albero	10 m	30 - 40	indifferente	H±	3	N±	< 800	Specie adatta a terreni diversi, ma non troppo aridi.	Oroginrio della Cina e Manciuria. Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus avium</i>	Ciliegio	Bianco	albero	20 m	20 - 40	indifferente	H±/H+	4	N±/N-	< 1.500	Suoli e condizioni climatiche prive di eccessi.	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus cerasifera</i>	Ciliegio susino, mirobalano	Bianco	albero	8 m	18 - 25	indifferente	H±	3	N±	< 1.000	Coltivi ornamentali.	Pianta ornamentale
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus cerasifera</i>	Ciliegio a grappoli, pado comune	Bianco	albero	5 m	16 - 22	indifferente	H±	3	N±	< 1.000	Coltivi ornamentali.	Pianta ornamentale
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus persica</i>	Pesco	Rosa	albero	10 m	20 - 40	indifferente	H±/H+	4	N±/N-	< 800	Suoli e condizioni climatiche prive di eccessi.	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus ssp.</i>	Pruno/susino	Bianco	albero	10 m	15 - 25	indifferente	H±	3	N-	< 900	Suoli e condizioni climatiche prive di eccessi.	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo, pruno selvatico	Bianco	arbusto	3 m	10 - 14	indifferente	H±/H+	4	N±	< 1.000	Arbusteti meso-termofili, boschi radi di latifoglie.	Produce bacche molto appetite da molti uccelli.
<i>Rosaceae</i>	<i>Pyrus communis</i>	Pero comune	Bianco	alberoi	10 m	20 - 30	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N±	< 1.000	Coltivi su versanti collinari e pedemontani ben esposti o su alta pianura alluvionale	Numerose varietà cultivar coltivate per la produzione di frutti.
<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa canuna</i>	Rosa canina, selvatica	Rosa	arbusto	2 m	40 - 50	indifferente	H±	4	N-	< 1.600	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, arbusteti mesotermofili, boschi radi.	Futti ricchi di vitamina C ed appetiti da uccelli.
<i>Rosaceae</i>	<i>Rosa banksiae</i>	Rosa di Lady Banks	Bianco	arbusto	3 m	40 - 50	infifferente	H±	4	N-	< 1.00	Coltivi su versanti collinari e pedemontani ben esposti o su alta pianura alluvionale	Ornamentale alloctona dalla Nuova Zelanda, adatta per la produzione di miele.
<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus caesius</i>	Rovo bluastro	Bianco	arbusto	2 m	15 - 25	indifferente	H±	2	N+	3	Zone umide, megaforbieti, saliceti arbustivi, pioppedti, saliceti, frassineti, ontaneti.	Radici molto profonde.
<i>Rosaceae</i>	<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori	Bianco	albero	2 - 15 m	8 - 10	indifferente	H-	3	N-	400 - 1.400	Tagli e strade forestali, boschi radi ed arbusteti mesotermofili.	Frutti rossi molto decorativi ed appetiti dagli uccelli.

<i>Rosaceae</i>	<i>Sorbus aria</i>	Sorbo montano	Bianco	albero	2 - 15 m	10 - 16	indifferente	H±	4	N-	< 2.000	Abusteti meso-termofili, gineprari, pinete rade, boschi radi mesotermofili, ghioaie, morene.	La peluria sulle foglie è utile per ridurre le perdite di acqua.
<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium anisophyllum</i>	Gaglio a foglie ineguali	Bianco	perenne	5 - 20	2 - 4	Ca	H±/H+	4	N-	1.000 - 2.500	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie alpine e subalpine, rocce, rupi, balme, boscaglie di pini, gineprai.	
<i>Rubiaceae</i>	<i>Galium mollugo</i>	Gaglio mollugo, gaglio morbido	Bianco	perenne	30 - 100	2 - 3	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Prat/ pascoli/praterie mesofili/eutrofilo, frutteti, margini dei boschi, arbusteti, boschi radi di latifoglie.	Proprietà antispasmodiche, astringenti, diuretiche, cicatrizzanti, antiflogistiche, ipotensive e sudorifere.
<i>Rubiaceae</i>	<i>Gallium verum</i>	Caglio giallo	Giallo	perenne	20 - 70	2 - 4	Ca - Si/Ca	H+	3	N-	< 1.800	Praterie, prati e pascoli più o meno aridi, rocciosi e mesofili, margini deiboschi, pinete, gineprai.	Coagula il latte e colora di giallo le bevande.
<i>Rutaceae</i>	<i>Citrus trifoliata</i>	Arancio trifogliato	Bianco	albero	3 m	15 - 25	indifferente	H±	3	N±	< 800	Coltivato come ornamentale in terreni fertili e ben drenati.	Esotica. Sopporta fino a - 20 °C. Caducifolia. Spinosa.
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Parnassia palustris</i>	Parnassia palustre	Bianco	perenne	5 - 30	20 - 26	indifferente	H±/H+	2	N-	< 2.500	Zone umide, sorgenti stillicidi, ruscelli, cascate, torbiere.	
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga granulata</i>	Sassifraga granulosa	Bianco	perenne	20 - 40	14 - 22	indifferente	H±	4	N-	< 1.200	Praterie, pascoli e prati aridi, più o meno petrosi, margini di boschi mesotermofili, arbusteti mesotermofili.	Un tempo si riteneva che gli spacchi nelle rocce fossero dovuti alle radici di questa pianta.
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga stellaris</i>	Sssifraga stellata	Bianco	perenne	5 - 20	8 - 12	indifferente	H±	1	N-	1.000 - 2.700	Sorgenti, stillicidi, ruscelli, cascate, zone umide, torbiere, vallette nivali.	
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga aizoides</i>	Sassifraga gialla, autunnale	Giallo	perenne	5 - 20	9 - 14	Ca - Si/Ca	H+	2	N-	600 - 2.500	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, sorgenti stillicidi, cascate, bordi di ruscelli, torbiere, praterie igrofile.	Da saxum = sasso e frango = rompo (spaccassasi).
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga oppositifolia</i>	Sassifraga a foglie opposte	Viola	perenne	1 - 6	10 - 15	Ca - Si/Ca	H±/H+	4	N-	1.400 - 2.700	Rupi, muri, balme, ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie più o meno petrose.	<i>Saxifraga</i> [sáxum - sasso + frángo- rompere); le piante insinuano le radici anche in piccole fessure e a rompere le rocce.
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga paniculata</i>	Sassifraga panicolata, sassifraga aizoon	Bianco	perenne	5 - 40	8 - 13	Ca - Si/Ca	H±/H+	5	N-	1.200 - 2.701	Rupi, muri, balme, ghiaie, morene, detriti, pietraie, praterie, prate e pascoli più o meno aridi e petrosi, alpini e sub.alpini.	La pianta si libera dall'eccesso di ioni calcio tramite ghiandole sui margini fogliari, formando delle caratteristiche punteggiature bianche.
<i>Saxifragaceae</i>	<i>Saxifraga retusa</i>	Sassifraga retusa	Rosa	perenne	1 - 5	7 - 10	Si	H-	4	N-	1.800 - 2.900	Rupi, mure, balme, roccia, ghiaie, morene, detriti, pietraie.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Cymbalaria muralis</i>	Cimbalaria dei muri	Rosa	annua pluriannuale	10 - 40	8 - 9	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 1.000	Rupi, muri, balme, rocce, ambienti ruderali, ghiaie, morebe, detriti, pietraie.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Digitalis lutea</i>	Digitale gialla minore	Giallo	perenne	50 - 100	20 - 30	Ca - Si/Ca	H+	3	N±	< 1.500	Tagli e schiarite forestali, ghiaie, detriti, pietraie, margini dei boschi, arbusteti, boschi radi.	Pianta debolmente velenosa (effetti sul cuore).
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Digitalis purpurea</i>	Digitale rossa	Rosso	bienn perenne	30 - 150	30 - 50	Si	H+	3	N±	< 1.400	Tagli e schiarite forestali, sentieri, sterrati, pioppeti, ontaneti, frassineti, saliceti ed altri boschi di latifoglie.	Contiene glicosidi che usati in giuste dosi hanno effetti farmacologici per malattie cardiologiche.
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Euphrasia rostkoviana</i>	Eufrasia	Bianco	annuale	5 - 25	6 - 12	indifferente	H±	4	N-	< 2.400	Ambienti ruderali, macerie, aree abbandonate, margini di piste, muri, schiarite forestali, prati, pascoli.	Semiparassita su diverse piante pratensi.
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Melampyrum velebicum</i>	Melampiro del Velebit	Giallo	annuale	20 - 50	18 - 22	Ca	H+	4	N+	< 1.400	Schiarite forestali, margini dei boschi, arbusteti mesotermofili, boschi radi di latifoglie.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Pedicularis comosa</i>	Pedicolare chiomata	Bianco	perenne	20 - 50	20 - 25	indifferente	H±	3	N±	800 - 2.200	Praterie, prati, pascoli, steppe.	Da <i>pediculus</i> (pidocchio), per l'antica credenza popolare che riteneva questa pianta portatrice di pidocchi per il bestiame che se ne cibava.
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Pedicularis gyroflexa</i>	Pedicolare spiralata	Rosa	perenne	10 - 30	20 - 30	Ca	H+	5	N-	900 - 2.500	Praterie alpine e subalpine (più o meno rocciose e/o pietrose), ghiaie, morene, pietraie.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Pedicularis kernerii</i>	Pedicolare di Kerner	Rosa	perenne	3 - 12	16 - 20	Si	H-	4	N-	1.600 - 2.600	Praterie alpine e subalpine, ghiaie, morene, detriti, pietraie.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Rhinanthus minor</i>	Cresta di gallo minore	Giallo	annuale	8 - 30	13 - 15	indifferente	H±	3	N-	< 2.000	Praterie, pascoli, prati.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum densiflorum</i>	Vrbasco densifloro	Giallo	biennale	50 - 150	30 - 50	Ca - Si/Ca	H+	4	N±	< 1.200	Ambienti ruderali, zone aride, tagli e schiarite forestali, praterie , prati e pascoli (più o meno rocciosi/petrosi).	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum nigrum</i>	Verbascio nero	Giallo	biennale perenne	30 - 100	18 - 25	indifferente	H+	4	N-	< 1.500	Ambienti ruderali, zone aride, tagli e schiarite forestali, praterie , prati e pascoli (più o meno rocciosi/petrosi).	

<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus montanum</i>	Verbascio a foglie spesse	Giallo	biennale	50 - 150	15 - 28	Si	H±	4	N±	< 2.200	Rupi, muri, rocce, balme, ghiaie, morene, detriti, pietraie, ambienti ruderali, praterie aride, margini di boschi.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Veronica agrestis</i>	Veronica agreste	Blu	annuale	5 - 30	3 - 7	Si - Si/Ca	H±	3	N+	< 1.400	Campi, colture, incolti, parchi, prati, giardini, ambienti ruderali, prati e pascoli mesofili.	
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Veronica beccalunga</i>	Veronica beccalunga	Blu	perenne	20 - 60	5 - 8	indifferente	H±	1	N+	< 2.200	Ambienti acquatici: rive, fossi, lanche, paludi, stagni. Prati inondatai, sorgenti, stillicidi, torbiere.	In passato germogli usati in insalata. Succo della pianta usata per cure primaverili (depirazione sangue e diuretico).
<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Veronica fruticans</i>	Veronica fruticosa	Blu	perenne	5 - 15	11 - 15	indifferente	H±	4	N-	600 - 2.600	Rupi, muri, balme, rocce, praterie alpine e subalpine, ghiaie, morene, pietraie, lande, boscaglie di pini.	
<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum nigrum</i>	Morella comune, erba morella	Bianco	annuale	10 - 80	8 - 12	Ca - Si/Ca	H±	3	N+	< 1.200	Campi, colture, vigne, incolti, ambienti ruderali	Contiene alcaloidi velenosi.
<i>Thymellaceae</i>	<i>Daphne mezereum</i>	Dafne mezereo, fior di stecco, pepe di montagna	Rosa	arbusto	30 - 100	7 - 10	indifferente	H+/H±	3	N±	< 2.200	Ghiaie, morene, detriti, pietraie, campi solcati, boschi di latifoglie.	Contiene diterpeni molto irritanti. Alcuni uccelli (ballerina, tordo,...) possono tuttavia nutrirsi dei frutti.
<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena officinalis</i>	Verbena comune	Rosa	annua biennale perenne	15 - 60	3 - 5	indiferente	H±	3	N±	< 1.300	Ambienti ruderali, prati e pascoli mesofili, campi e colture.	Un tempo erano attribuite numerose proprietà medicinali. Oggi viene usata come rimedio contro la tosse.
<i>Violaceae</i>	<i>Viola alba</i>	Viola bianca	Bianco	perenne	5 - 15	15 - 20	Ca - Si/Ca	H+/H±	4	N-	< 800	Siepi, margini di boschi, tagli e piste forestali, arbusteti.	
<i>Violaceae</i>	<i>Viola arvensis</i>	Viola dei campi	Giallo	annuale	10 - 20	10 - 15	indifferente	H±	3	N±	< 1.800	Campi, colture, incolti, ambienti ruderali e semiruderali	Proprietà farmaceutiche depurative, tossifughe, espettoranti emollienti.
<i>Violaceae</i>	<i>Viola Biflora</i>	Viola biflora	Giallo	perenne	5 - 20	10 - 15	indifferente	H±	2	N+	500 - 2.500	Rupi, balme, megaforbieti, popolamenti a felci, saliceti ed ontaneti di riva, sorgenti, ruscelli.	Il nome specifico indica i fiori, che spesso nascono appaiati.
<i>Violaceae</i>	<i>Viola calcarata</i>	Viola speronata	Viola	perenne	3 - 10	20 - 40	indifferente	H±	3	N-	1.000 - 2.300	Praterie alpine e subalpine anche più o meno rocciose e/o pietrose, lande, ghiaie, morene, pietraie.	Almeno tre varietà di calcarata.
<i>Violaceae</i>	<i>Viola cenisia</i>	Viola del Moncenisio	Viola	perenne	3 - 10	20 - 25	Ca	H±	3	N-	1.800 - 2.600	Ghiaie, morene, detriti, pietraie.	
<i>Violaceae</i>	<i>Viola lutea</i>	Viola gialla	Giallo	perenne	10 - 20	20 - 30	indifferente	H+	4	N-	1.000 - 2.000	Praterie alpine e subalpine, più o meno petrose.	
<i>Violaceae</i>	<i>Viola odorata</i>	Viola mammola	Viola	perenne	5 - 15	10 - 20	indifferente	H±	3	N+	< 1.200	Tagli e schiarire forestali, parchi, prati, margini dei boschi, boschi radi, arbusteti.	I fiori contengono olio essenziale profumato.
<i>Violaceae</i>	<i>Viola pinnata</i>	Viola pennata	Viola	perenne	5 - 15	10 - 20	Ca	H+	5	N-	500 - 2.100	Ghiaie, morene, pietraie, detriti, rupi, balme, praterie e pascoli aridi, pinete, gineprai.	
<i>Violaceae</i>	<i>Viola rupestris</i>	Viola rupestre	Viola	perenne	2 - 8	10 - 15	Ca - Si/Ca	H±	4	N-	<800 - 2.000	Rupi, muri, balme, ghiaie, morene, praterie e pascoli più o meno aridi, pinete, gineprai.	